

気胸

ステップ名称		手術前日	手術当日（前）	手術当日（後）	術後1日
		1日目	2日目		3日目
治療（処置）				心電図モニターがつきます	⇒ 心電図モニターがつきます
				酸素吸入をします	⇒ 酸素吸入をします
					8時に酸素吸入を外します
				創部の処置をします	⇒ 創部の処置をします
				ドレーンの管理をします	⇒ ドレーンの管理をします
薬剤	内服中の薬で手術に伴い中止する薬の有無を主治医に確認します	内服薬がある場合は少量の水で内服します			許可あれば内服薬を再開します
注射		手術時間によっては手術前から点滴があります	点滴があります	点滴があります	
検査				胸部レントゲン撮影があります（手術室）	病室で胸部レントゲン撮影があります
				足の付け根の動脈から採血します	足の付け根の動脈から採血します
				血液検査があります	血液検査があります
食事/栄養	24時以降は絶食です	水分を取る事ができませんが、うがいはできます	絶食です 主治医許可あれば飲水可	昼より全粥食です	
日常生活ケア	安全/活動	制限はありません	制限はありません	ベッド上安静です ベッドを30度まで起こして座れます	制限はありません
日常生活ケア	清潔	シャワー浴を行います			身体を拭きます ドレーンが抜けたらシャワー浴可能です
日常生活ケア	教育/指導	手術についての説明をします 絶食についての説明をします	義歯や貴金属などは外します		
	排泄	制限はありません	制限はありません	ベッドで安静にします	尿の管を抜きます
観察		体温、血圧、脈拍、SpO2を測ります	⇒ 体温、血圧、脈拍、SpO2を測ります	体温、血圧、脈拍、SpO2を測定します 覚醒状態をみていきます 創痛、出血、発赤、腫脹、 エアーリーク、皮下気腫、排液量、 排液の性状 呼吸状態、喀痰の有無などを観察します	⇒ 体温、血圧、脈拍、SpO2を測定します 覚醒状態をみていきます 創痛、出血、発赤、腫脹、 エアーリーク、皮下気腫、排液量、 排液の性状 呼吸状態、喀痰の有無などを観察します
リハビリ/その他					

気胸

ステップ名称		術後2日	術後3日
		4日目	5日目
治療（処置）			
		 創部の処置をします	 創部の処置をします
		 ドレーンの管理をします	 ドレーンの管理をします
薬剤			
注射			
検査		 胸部レントゲン撮影があります	 胸部レントゲン撮影があります
			 血液検査があります
食事/栄養		 昼食より普通食です	 普通食です
日常生活ケア	安全/活動		
日常生活ケア	清潔	 身体を拭きます ドレーンが抜けたらシャワー浴可能です	 身体を拭きます ドレーンが抜けたらシャワー浴可能です
日常生活ケア	教育/指導		 再発予防のため禁煙をおすすめします
	排泄		
観察		 体温、血圧、脈拍、SpO2を測定します 創痛、出血、発赤、腫脹、エアリーク、皮下気腫、排液量、排液の性状、呼吸状態、喀痰の有無などを観察します	 体温、血圧、脈拍、SpO2を測定します 創痛、出血、発赤、腫脹、エアリーク、皮下気腫、排液量、排液の性状、呼吸状態、喀痰の有無などを観察します
リハビリ/その他			