






# 乳房切除、センチネル(Bt+SLNB)

ステップ名称		手術前日	当日手術前	当日手術後	術後1日目
		1日目	2日目		3日目
治療 (処置)				心電図モニターがつきます	心電図モニターがつきます
				酸素吸入をします	酸素吸入をします
				創部の処置をします	創部の処置をします
				ドレーンの管理を行います	ドレーンの管理を行います
薬剤		内服中の薬で手術に伴い中止する薬の有無を確認します	内服薬がある場合は少量の水で内服します		許可あれば内服薬を再開します
注射			午後からの手術の場合、手術前から点滴があります	点滴があります	点滴があります
検査				術後、血液検査があります	血液検査があります
食事/栄養		24時以降は絶食です	朝7時から絶飲食ですが、うがいはできます	主治医の許可があれば4時間後から飲水できます	主治医許可があれば飲水可能です
					昼より全粥食です
日常生活ケア	安全/活動	制限はありません		ベッドで安静にします	主治医の許可があれば朝から歩行可能です
日常生活ケア	清潔	シャワーをします			体を拭きます
日常生活ケア	教育/指導		義歯や貴金属などは外します		
		交換ノートの説明をします			
	手術に関する説明をします 絶飲食について説明をします				
日常生活ケア	排泄	制限はありません	制限はありません	尿管が入ります ベッドで安静にします	尿管を抜きます
観察		体温、血圧、脈拍、SpO2を測ります	体温、血圧、脈拍、SpO2を測ります	体温、血圧、脈拍、SpO2を測定します 覚醒状態をみていきます 創部の痛みの程度や出血、腫脹、発赤の有無やドレーンの量や性状の観察をします 手術した方のむくみやしびれの有無を観察します	体温、血圧、脈拍、SpO2を測定します 覚醒状態をみていきます 創部の痛みの程度や出血、腫脹、発赤の有無やドレーンの量や性状の観察をします 手術した方のむくみやしびれの有無を観察します
リハビリ/その他					リハビリを開始します
		歯科受診があります			


# 乳房切除、センチネル(Bt+SLNB)

ステップ名称		術後2日	術後3日	術後4日	術後5日
		4日目	5日目	6日目	7日目
治療 (処置)					
		⇒ 創部の処置をします	⇒ 創部の処置をします	⇒ 創部の処置をします	⇒ 創部の処置をします
		⇒ ドレーンの管理を行います	⇒ ドレーンの管理を行います	⇒ ドレーンの管理を行います	⇒ ドレーンの管理を行います
薬剤					
注射					
検査					
食事/栄養		 昼から普通食です	 常食		
日常生活ケア	安全/活動	 制限はありません			
日常生活ケア	清潔	⇒ 体を拭きます	 ドレーンが抜けたらシャワーができます	⇒ ドレーンが抜けたらシャワーができます	⇒ ドレーンが抜けたらシャワーができます
日常生活ケア	教育/指導				
	排泄	 制限はありません			
観察		 体温、血圧、脈拍、SpO2を測定します 創部の痛みの程度や出血、腫脹、発赤の有無やドレーンの量や性状の観察をします 手術した方のむくみやしびれの有無を観察します	⇒ 体温、血圧、脈拍、SpO2を測定します 創部の痛みの程度や出血、腫脹、発赤の有無やドレーンの量や性状の観察をします 手術した方のむくみやしびれの有無を観察します	⇒ 体温、血圧、脈拍、SpO2を測定します 創部の痛みの程度や出血、腫脹、発赤の有無やドレーンの量や性状の観察をします 手術した方のむくみやしびれの有無を観察します	⇒ 体温、血圧、脈拍、SpO2を測定します 創部の痛みの程度や出血、腫脹、発赤の有無やドレーンの量や性状の観察をします 手術した方のむくみやしびれの有無を観察します
リハビリ/その他					

# 乳房切除、センチネル(Bt+SLNB)

ステップ名称		術後6日	術後7日	術後8日	術後9日
		8日目	9日目	10日目	11日目
治療 (処置)					
		⇒ 創部の処置をします ⇒ ドレーンの管理を行います	⇒ 創部の処置をします ⇒ ドレーンの管理を行います	⇒ 創部の処置をします ⇒ ドレーンの管理を行います	⇒ 創部の処置をします ⇒ ドレーンの管理を行います
薬剤					
注射					
検査			⇒ 血液検査があります 		
			 胸部レントゲン撮影があります		
食事/栄養					
日常生活ケア	安全/活動				
日常生活ケア	清潔	⇒ ドレーンが抜けたらシャワーができます	⇒ ドレーンが抜けたらシャワーができます	⇒ ドレーンが抜けたらシャワーができます	⇒ ドレーンが抜けたらシャワーができます
日常生活ケア	教育/指導	 退院後の生活について説明します			
	排泄				
観察		⇒ 体温、血圧、脈拍、SpO2を測定します 創部の痛みの程度や出血、腫脹、発赤の有無やドレーンの量や性状の観察をします 手術した方のむくみやしびれの有無を観察します	⇒ 体温、血圧、脈拍、SpO2を測定します 創部の痛みの程度や出血、腫脹、発赤の有無やドレーンの量や性状の観察をします 手術した方のむくみやしびれの有無を観察します	⇒ 体温、血圧、脈拍、SpO2を測定します 創部の痛みの程度や出血、腫脹、発赤の有無やドレーンの量や性状の観察をします 手術した方のむくみやしびれの有無を観察します	⇒ 体温、血圧、脈拍、SpO2を測定します 創部の痛みの程度や出血、腫脹、発赤の有無やドレーンの量や性状の観察をします 手術した方のむくみやしびれの有無を観察します
リハビリ/その他					

# 乳房切除、センチネル(Bt+SLNB)

ステップ名称		術後10日
		12日目
治療 (処置)		 抜糸をします
		 リンパ浮腫指導
		 創部の処置をします
		 ドレーンの管理を行います
薬剤		
注射		
検査		
食事/栄養		
日常生活ケア	安全/活動	
日常生活ケア	清潔	 ドレーンが抜けたらシャワーができます
日常生活ケア	教育/指導	
	排泄	
観察		 体温、血圧、脈拍、SpO2を測定します 創部の痛みの程度や出血、腫脹、発赤の有無やドレーンの量や性状の観察をします 手術した方のむくみやしびれの有無を観察します
リハビリ/その他		