

# 腹腔鏡下胆嚢摘出術

ステップ名称		手術前日	手術当日前	手術当日後	術後1日目	術後2日目	術後3日目
		1日目	2日目		3日目	4日目	5日目
		手術前日	手術当日前	手術当日後	術後1日目	術後2日目	術後3日目
治療（処置）		術前面談があります		酸素吸入します	酸素吸入します	ドレーン抜去	
		麻酔前診察があります		心電図モニター装置をつけます	心電図モニター装置をつけます		
		へその処置をします		鎮痛緩和処置	創部の処置をします	創部の処置をします	創部の処置をします
				ドレーン留置			
薬剤		21時、下剤を飲みます	朝浣腸があります				
注射				24時間持続点滴があります	点滴があります		
				抗生剤の点滴があります	抗生剤の点滴が1～2日あります		
検査		血液検査があります		手術室でレントゲン撮影があります	血液検査があります		
		レントゲン検査があります			お部屋でレントゲン撮影があります		
		心電図検査があります					
		呼吸機能検査があります					
		腹部エコー検査があります					
	MRI検査があります						
食事/栄養		普通食です	絶飲食です	絶飲食です	朝から飲水できます	朝から普通食が食べられます	普通食です
					朝から軟飯食が食べれます		
日常生活ケア	安全/活動	制限なしです	制限なしです	ベッド上安静です	トイレ歩行ができます	制限なしです	制限なしです
日常生活ケア	清潔					体を拭きます	シャワー浴可
日常生活ケア	教育/指導	バスの説明	マニキュアは除去します	手術後の説明があります			
		VTEバスの説明					
		抗生剤の説明					
		手術必要物品の依頼					
日常生活ケア	排泄		トイレ	尿のお管を留置しておきます ベッド上安静です	尿の管をを抜きます	トイレ	トイレ
					トイレ		
観察		持参薬の確認をします	入室前バイタル測定：体温 脈拍 血圧 SpO2	バイタル測定：術後帰室時、1時間、2時間、4時間毎： 体温 脈拍 血圧 SpO2	バイタル測定：4検 脈拍 血圧 SpO2	バイタル測定：3検 脈拍 血圧 SpO2	バイタル測定：2検 脈拍 血圧 SpO2
		必要物品の確認をします		尿量	尿量	嘔気・嘔吐	嘔気・嘔吐
		手術持参物の確認をします		呼吸音・肺雑音	呼吸音・肺雑音	創痛	創痛
		手術室看護師の訪問があります		嘔気・嘔吐	嘔気・嘔吐	排ガス・腹満	排ガス・腹満
				創痛	創痛		
				腸雑・腹満	腸雑・腹満		
			ドレーンの性状・量	ドレーンの性状・量			
リハビリ/その他				リハビリテーション			

# 腹腔鏡下胆嚢摘出術

ステップ名称		術後4日目	術後5日目	術後6日目	術後7日目
		6日目	7日目	8日目	9日目
		術後4日目	術後5日目	術後6日目	術後7日目
治療（処置）					 抜糸は1週間を目安に行います。
		 創部の処置をします	 創部の処置をします	 創部の処置をします	 創部の処置をします
薬剤					
注射					
検査		 血液検査があります			
食事/栄養		 普通食です	 普通食です	 普通食です	 普通食です
日常生活ケア	安全/活動	 制限なしです	 制限なしです	 制限なしです	 制限なしです
日常生活ケア	清潔	 シャワー浴可	 シャワー浴可	 シャワー浴可	 入浴できます
日常生活ケア	教育/指導			 退院指導があります	
	排泄	 トイレ	 トイレ	 トイレ	 トイレ
観察		 バイタル測定：2検 脈拍 血圧 SpO2	 バイタル測定：2検 脈拍 血圧 SpO2	 バイタル測定：1検 脈拍 血圧 SpO2	 バイタル測定：1検 脈拍 血圧 SpO2
		 嘔気・嘔吐	 嘔気・嘔吐	 嘔気・嘔吐	 嘔気・嘔吐
		 創痛	 創痛	 創痛	 創痛
		 排ガス・腹満	 排ガス・腹満	 排ガス・腹満	 排ガス・腹満
リハビリ/その他					