

採用区分	薬品名	標榜薬効	規制区分
両採用	1%ディプリバン注-キット	全身麻酔・鎮静用剤	劇
院外採用	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	寄生性皮膚疾患剤	
両採用	20%マンニトール注射液「YD」	脳圧降下・浸透圧利尿剤	
院外採用	25mgアリナミンF糖衣錠	ビタミンB1誘導體	
院外採用	2mgセルシン錠	マイナートランキライザー	精3
両採用	5-FU軟膏5%協和	抗腫瘍外用剤	劇
院外採用	5mgコントロール錠	マイナートランキライザー	
院外採用	5mgセルシン錠	マイナートランキライザー	精3
院外採用	ATP腸溶錠20mg「日医工」	ATP製剤	
両採用	EOB・プリモビスト注シリンジ	線状型MRI用肝臓造影剤	
院外採用	EPLカプセル250mg	肝臓疾患・高脂質血症用剤	
院外採用	JPS八味地黄丸料エキス顆粒〔調剤用〕	漢方製剤	
両採用	KCL注10mEqキット「テルモ」	補正用電解質液	
両採用	KCL注20mEqキット「テルモ」	補正用電解質液	
両採用	l-メントール「ホエイ」	矯味・矯臭剤	
両採用	MAGシンチ注	腎・尿路疾患診断薬	
両採用	MAGシンチ注	腎・尿路疾患診断薬	
院外採用	MSコンチン錠10mg	持続性癌疼痛治療剤	麻劇
両採用	MSツワイスロンカプセル10mg	持続性癌疼痛治療剤	麻劇
院外採用	MSツワイスロンカプセル60mg	持続性癌疼痛治療剤	麻劇
院外採用	MS温シップ「タイホウ」	鎮痛・消炎パップ剤	
院外採用	MS冷シップ「タイホウ」	鎮痛・消炎パップ剤	
両採用	PL配合顆粒	総合感冒剤	劇
院外採用	SG配合顆粒	解熱鎮痛剤	
両採用	SPTローチ0.25mg「明治」	口腔用剤	
院外採用	アーチスト錠1.25mg	慢性心不全治療剤	
院外採用	アーチスト錠10mg	持続性高血圧・狭心症、慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤	
院外採用	アーチスト錠2.5mg	慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤	
院外採用	アーチスト錠20mg	持続性高血圧・狭心症、頻脈性心房細動治療剤	
両採用	アーテン錠(2mg)	パーキンソン症候群治療剤	
院外採用	アーリーダ錠60mg	前立腺癌治療剤	劇
両採用	アイクルシグ錠15mg	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼインヒビター	劇
両採用	アイセントレス錠400mg	HIVインテグラーゼ阻害剤	劇
院外採用	アイトロール錠20mg	狭心症治療用ISMN製剤	
両採用	アイピーディカプセル100	アレルギー性疾患治療剤	
院外採用	アイピーディカプセル50	アレルギー性疾患治療剤	
院外採用	アイピーディドライシロップ5%	アレルギー性疾患治療剤	
両採用	アイファガン点眼液0.1%	緑内障・高眼圧症治療剤	
院外採用	アイベータ配合点眼液	緑内障・高眼圧症治療剤	
院外採用	アイミクス配合錠HD	長時間作用型ARB/持続性Ca拮抗薬配合剤	劇
院外採用	アイミクス配合錠LD	長時間作用型ARB/持続性Ca拮抗薬配合剤	劇
院外採用	アイラミド配合懸濁性点眼液	緑内障・高眼圧症治療剤	
院外採用	アカルボース錠100mg「サワイ」	食後過血糖改善剤	
院外採用	アカルボース錠50mg「サワイ」	食後過血糖改善剤	
両採用	アキネトン錠1mg	パーキンソン症候群治療剤	
両採用	アクアチムクリーム1%	ニューキノロン系外用抗菌剤	
両採用	アクテムラ点滴静注用200mg	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体	劇
両採用	アクテムラ点滴静注用400mg	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体	劇
両採用	アクテムラ点滴静注用80mg	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体	劇
両採用	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体	劇
院外採用	アクトス錠15	インスリン抵抗性改善剤-2型糖尿病治療剤-	

院外採用	アクトス錠30	インスリン抵抗性改善剤－2型糖尿病治療剤－	
院外採用	アクトネル錠17.5mg	骨粗鬆症・骨ページェット病治療剤	劇
院外採用	アクトネル錠2.5mg	骨粗鬆症治療剤	劇
院外採用	アクトネル錠75mg	骨粗鬆症治療剤	劇
両採用	アクプラ静注用100mg	抗悪性腫瘍剤	
両採用	アクプラ静注用10mg	抗悪性腫瘍剤	
両採用	アクプラ静注用50mg	抗悪性腫瘍剤	
両採用	アクラシノン注射用20mg	抗腫瘍性抗生物質	劇
院外採用	アグリリンカプセル0.5mg	本態性血小板血症治療剤	劇
院外採用	アクロマイシン軟膏3%	抗生物質製剤	
院外採用	アコファイド錠100mg	機能性ディスベプシア（FD）治療剤	
両採用	アサコール錠400mg	潰瘍性大腸炎治療剤	
両採用	アザシチジン注射用100mg「サワイ」	骨髄異形成症候群・急性骨髄性白血病治療剤	劇
院外採用	アザルフィジンEN錠250mg	抗リウマチ剤	
両採用	アザルフィジンEN錠500mg	抗リウマチ剤	
両採用	アシアロシンチ注	肝機能診断薬	
両採用	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	抗ウイルス化学療法剤	
両採用	アシクロビル顆粒40%「サワイ」	抗ウイルス化学療法剤	
院外採用	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	15員環マクロライド系抗生物質	
院外採用	アシノン錠150mg	H2受容体拮抗剤	
院外採用	アシノン錠75mg	H2受容体拮抗剤	
両採用	アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」	持続性AT1レセプターブロッカー	
院外採用	アジルバ錠20mg	持続性AT1レセプターブロッカー	
院外採用	アジルバ錠40mg	持続性AT1レセプターブロッカー	
両採用	アジレクト錠1mg	パーキンソン病治療剤	劇
院外採用	アスタットクリーム1%	抗真菌剤	
院外採用	アスタット外用液1%	抗真菌剤	
院外採用	アスタット軟膏1%	抗真菌剤	
両採用	アストミン錠10mg	鎮咳剤	
両採用	アズノールうがい液4%	アズレン含嗽液	
両採用	アズノール軟膏0.033%	炎症性皮膚疾患治療剤	
両採用	アスパラーCA錠200	Caアスパルテート製剤	
院外採用	アスパラカリウム散50%	Kアスパルテート製剤	
両採用	アスパラカリウム錠300mg	Kアスパルテート製剤	
両採用	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	Kアスパルテート製剤	
院外採用	アスピリン「ホエイ」	解熱鎮痛消炎剤・川崎病用剤	
両採用	アスピリン原末「マルイシ」	解熱鎮痛消炎剤・川崎病用剤	
院外採用	アスピリン腸溶錠100mg「日医工」	抗血小板剤	
両採用	アスプールの液（0.5%）	吸入用気管支拡張剤	
院外採用	アスペノンカプセル10	不整脈治療剤	劇
院外採用	アスペノンカプセル20	不整脈治療剤	劇
両採用	アスベリンシロップ0.5%	鎮咳剤	
院外採用	アスベリンドライシロップ2%	鎮咳剤	
両採用	アスベリン散10%	鎮咳剤	
院外採用	アスベリン錠10	鎮咳剤	
院外採用	アスベリン錠20	鎮咳剤	
院外採用	アズマネックスツイストヘラー100μg60吸入	吸入ステロイド喘息治療剤	
院外採用	アセトアミノフェン「JG」原末	解熱鎮痛剤	劇
院外採用	アセトアミノフェンDS40%「三和」	解熱鎮痛剤	劇
院外採用	アセトアミノフェンDS小児用20%「三和」	小児用解熱鎮痛剤	劇
院外採用	アゼプチン錠0.5mg	アレルギー性疾患治療剤	
院外採用	アゼプチン錠1mg	アレルギー性疾患治療剤	
両採用	アセリオ静注液1000mgバッグ	解熱鎮痛剤	劇
院外採用	アゼルニジピン錠16mg「タナベ」	持続性Ca拮抗剤	

両採用	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」	持続性Ca拮抗剤	
両採用	アゾセמיד錠30mg「DSEP」	持続型ループ利尿剤	
院外採用	アゾルガ配合懸濁性点眼液	緑内障・高眼圧症治療剤	
院外採用	アダプチノール錠5mg	暗順応改善剤	
院外採用	アダラートCR錠10mg	持続性Ca拮抗剤/高血圧・狭心症治療剤	劇
院外採用	アダラートCR錠20mg	持続性Ca拮抗剤/高血圧・狭心症治療剤	劇
院外採用	アダラートCR錠40mg	持続性Ca拮抗剤/高血圧・狭心症治療剤	劇
院外採用	アタラックス-Pカプセル25mg	抗アレルギー性緩和剤	
両採用	アタラックス-P注射液(25mg/ml)	抗アレルギー性緩和剤	
両採用	アタラックス錠10mg	抗アレルギー性緩和剤	
両採用	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」	ヒト型抗ヒトTNF $\alpha$ モノクローナル抗体製剤	劇
院外採用	アデカット15mg錠	ACE-I降圧剤	
両採用	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	心臓疾患診断補助剤	
両採用	アデホス-Lコーワ注20mg	代謝賦活剤	
院外採用	アデホスコーフ腸溶錠20	代謝賦活剤	
院内採用	アデホスコーフ腸溶錠60	代謝賦活剤	
院外採用	アデホスコーフ顆粒10%	代謝賦活・抗めまい剤	
院外採用	アデムパス錠0.5mg	可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)刺激剤	劇
院外採用	アデムパス錠1.0mg	可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)刺激剤	劇
院外採用	アデムパス錠2.5mg	可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)刺激剤	劇
両採用	アデラビン9号注1mL	肝臓抽出製剤	
院外採用	アテレック錠10	持続性Ca拮抗降圧剤	
院外採用	アテレック錠20	持続性Ca拮抗降圧剤	
院外採用	アテレック錠5	持続性Ca拮抗降圧剤	
院外採用	アドエア100ディスクス28吸入用	喘息治療配合剤	
院外採用	アドエア100ディスクス60吸入用	喘息治療配合剤	
院外採用	アドエア125エアゾール120吸入用	喘息・COPD治療配合剤	
院外採用	アドエア250エアゾール120吸入用	喘息治療配合剤	
院外採用	アドエア250ディスクス28吸入用	喘息・COPD治療配合剤	
両採用	アドエア250ディスクス60吸入用	喘息・COPD治療配合剤	
院外採用	アドエア500ディスクス28吸入用	喘息治療配合剤	
院外採用	アドエア500ディスクス60吸入用	喘息治療配合剤	
院外採用	アドエア500エアゾール120吸入用	喘息治療配合剤	
院外採用	アトーゼット配合錠HD	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-C $\alpha$ 還元酵素阻害剤配合剤	
院外採用	アトーゼット配合錠LD	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-C $\alpha$ 還元酵素阻害剤配合剤	
両採用	アトガム点滴静注液250mg	免疫抑制剤	劇
両採用	アドセトリス点滴静注用50mg	抗悪性腫瘍剤/微小管阻害薬結合抗CD30モノクローナル抗体	劇
両採用	アドソルピン原末	消化管用吸着剤	
院外採用	アドナ散10%	対血管薬剤	
両採用	アドナ錠10mg	対血管薬剤	
院外採用	アドフィードパップ40mg	経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤	
両採用	アドベイト静注用キット1000	遺伝子組換え血液凝固第VII因子製剤	
両採用	アドベイト静注用キット2000	遺伝子組換え血液凝固第VII因子製剤	
院外採用	アドベイト静注用キット250	遺伝子組換え血液凝固第VII因子製剤	
院外採用	アドベイト静注用キット500	遺伝子組換え血液凝固第VII因子製剤	
院外採用	アトモキセチン錠40mg「トーワ」	注意欠陥/多動性障害治療剤	劇
両採用	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	HMG-C $\alpha$ 還元酵素阻害剤	
院外採用	アトルバスタチン錠10mg「トーワ」	HMG-C $\alpha$ 還元酵素阻害剤	
院外採用	アトルバスタチン錠5mg「トーワ」	HMG-C $\alpha$ 還元酵素阻害剤	
両採用	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	アドレナリン注射液	劇

両採用	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	鎮痙剤	劇
院外採用	アトロベントエロゾル20 $\mu$ g	抗コリン性気管支収縮抑制剤	
両採用	アナストロゾール錠1mg「DSEP」	アロマターゼ阻害剤/閉経後乳癌治療剤	劇
院外採用	アナフラニール錠10mg	うつ病・うつ状態・遺尿症・情動脱力発作治療剤	
院外採用	アナフラニール錠25mg	うつ病・うつ状態・遺尿症・情動脱力発作治療剤	
両採用	アナペイン注2mg/mL	長時間作用性局所麻酔剤	劇
両採用	アナペイン注7.5mg/mL	長時間作用性局所麻酔剤	劇
院外採用	アニューイティ100 $\mu$ gエリプタ30吸入用	吸入ステロイド喘息治療剤	
院外採用	アニューイティ200 $\mu$ gエリプタ30吸入用	吸入ステロイド喘息治療剤	
両採用	アネメトロ点滴静注液500mg	嫌気性菌感染症治療剤	
両採用	アノーロエリプタ30吸入用	COPD治療配合剤	
両採用	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	抗悪性腫瘍剤/抗VEGFヒト化モノクローナル抗体	劇
両採用	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	抗悪性腫瘍剤/抗VEGFヒト化モノクローナル抗体	劇
院外採用	アバプロ錠100mg	長時間作用型ARB	
院外採用	アバプロ錠50mg	長時間作用型ARB	
両採用	アピドラ注100単位/mL	超速効型インスリンアナログ製剤	劇
院外採用	アピドラ注ソロスター	超速効型インスリンアナログ製剤	劇
両採用	アフィニール錠5mg	抗悪性腫瘍剤/mTOR阻害剤	劇
両採用	アブストラル舌下錠100 $\mu$ g	癌疼痛治療剤	麻劇
両採用	アブストラル舌下錠200 $\mu$ g	癌疼痛治療剤	麻劇
院外採用	アフタゾロン口腔用軟膏0.1%	口腔粘膜用剤	
院外採用	アフタッチ口腔用貼付剤25 $\mu$ g	付着性アフタ性口内炎治療剤	
両採用	アブラキサ点滴静注用100mg	抗悪性腫瘍剤	特生
両採用	アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」	不整脈治療剤	劇
院外採用	アプレース錠100mg	胃炎・胃潰瘍治療剤	
両採用	アプレピタントカプセル125mg「サワイ」	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤	
両採用	アプレピタントカプセル80mg「サワイ」	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤	
院外採用	アベロックス錠400mg	ニューキノロン系経口抗菌剤	劇
院外採用	アポハイドローション20%	原発性手掌多汗症治療剤	
院外採用	アボルブカプセル0.5mg	前立腺肥大症治療薬	劇
院外採用	アマージ錠2.5mg	5HT受容体作動型片頭痛治療剤	劇
院外採用	アマリール0.5mg錠	スルホニルウレア系血糖降下剤	劇
院外採用	アマリール1mg錠	スルホニルウレア系血糖降下剤	劇
院外採用	アマリール3mg錠	スルホニルウレア系血糖降下剤	劇
院外採用	アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」	精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤	
両採用	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	不整脈治療剤	劇
院外採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	不整脈治療剤	
両採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	不整脈治療剤	
両採用	アミカシン硫酸塩注射液100mg「SW」	アミノグリコシド系抗生物質	
院外採用	アミサリン錠125mg	不整脈治療剤	
両採用	アミゼットB輸液	総合アミノ酸製剤	
両採用	アミティーザカプセル12 $\mu$ g	クロライドチャンネルアクチベーター	
院外採用	アミティーザカプセル24 $\mu$ g	クロライドチャンネルアクチベーター	
両採用	アミノレバンEN配合散	肝不全用栄養剤	
両採用	アミノレバン点滴静注	肝性脳症改善アミノ酸製剤	
院外採用	アムバロ配合OD錠「トーワ」	選択的AT1受容体ブロッカー/持続性Ca拮抗薬配合剤	劇
両採用	アムピゾーム点滴静注用50mg	ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製剤	
両採用	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤	劇
院外採用	アムロジピンOD錠2.5mg「科研」	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤	劇
両採用	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤	劇
院外採用	アムロジピン錠10mg「トーワ」	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤	劇
院外採用	アムロジピン錠2.5mg「日医工」	持続性Ca拮抗剤	劇
院外採用	アムロジピン錠5mg「タイヨー」	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤	劇

院外採用	アムロジンOD錠10mg	高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤	劇
院外採用	アムロジンOD錠2.5mg	高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤	劇
院外採用	アムロジンOD錠5mg	高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤	劇
院外採用	アムロジン錠2.5mg	高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤	劇
院外採用	アムロジン錠5mg	高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤	劇
両採用	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	本態性・起立性・透析時低血圧治療剤	
両採用	アメナリーフ錠200mg	抗ヘルペスウイルス剤	
院外採用	アモキシサンカプセル10mg	うつ病・うつ状態治療剤	劇
院外採用	アモキシサンカプセル25mg	うつ病・うつ状態治療剤	劇
両採用	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	合成ペニシリン製剤	
院外採用	アモバン錠10	睡眠障害改善剤	精3
院外採用	アモバン錠7.5	睡眠障害改善剤	精3
両採用	アラグリオ顆粒剤分包1.5g	光線力学診断用剤	
院外採用	アラセナー-Aクリーム3%	抗ウイルス剤	
両採用	アラセナー-A点滴静注用300mg	抗ウイルス剤	
院外採用	アラセナー-A軟膏3%	抗ウイルス剤	
両採用	アラノンジー静注用250mg	抗悪性腫瘍剤	劇
院外採用	アラバ錠10mg	抗リウマチ剤	劇
院外採用	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤	
両採用	アリクストラ皮下注1.5mg	合成Xa阻害剤	
両採用	アリクストラ皮下注2.5mg	合成Xa阻害剤	
院外採用	アリセプトD錠10mg	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤	劇
院外採用	アリセプトD錠3mg	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤	劇
院外採用	アリセプトD錠5mg	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤	劇
院外採用	アリセプト錠10mg	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤	劇
院外採用	アリセプト錠3mg	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤	劇
院外採用	アリセプト錠5mg	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤	劇
両採用	アリナミンF100注	ビタミンB1誘導体	
両採用	アリピプラゾールOD錠24mg「トーワ」	抗精神病剤	劇
両採用	アリピプラゾールOD錠3mg「トーワ」	抗精神病剤	劇
院外採用	アリミデックス錠1mg	アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤	劇
院外採用	アリメジンシロップ0.05%	抗ヒスタミン剤	
両採用	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」	抗トロンピン剤	
両採用	アルケラン錠2mg	抗多発性骨髄腫剤	
両採用	アルケラン静注用50mg	造血幹細胞移植前処置剤	
両採用	アルサルミン細粒90%	胃炎・消化性潰瘍治療剤	
院外採用	アルジオキサ顆粒50%「あすか」	胃炎・消化性潰瘍治療剤	
両採用	アルスロマチック関節手術用灌流液	関節手術用灌流・洗浄液	
院外採用	アルダクトンA錠25mg	抗アルドステロン性利尿・降圧剤	
院外採用	アルタットカプセル75mg	H2受容体拮抗剤	
両採用	アルドメット錠125	血圧降下剤	
院外採用	アルドメット錠250	血圧降下剤	
院外採用	アルピニー坐剤50	小児用解熱鎮痛剤	
両採用	アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」	活性型ビタミンD3製剤	劇
両採用	アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」	活性型ビタミンD3製剤	劇
院外採用	アルファロールカプセル0.25μg	Ca・骨代謝改善剤	劇
院外採用	アルファロールカプセル0.5μg	Ca・骨代謝改善剤	劇
院外採用	アルファロールカプセル1μg	Ca・骨代謝改善剤	劇
院外採用	アルファロール散1μg/g	Ca・骨代謝改善剤	劇
両採用	アルファロール内用液0.5μg/mL	Ca・骨代謝改善剤	劇
両採用	アルプロスタジールアルファデクス注射用20μg「タカタ」	PGE1製剤	劇
両採用	アルベカシン硫酸塩注射液75mg「テバ」	アミノグリコシド系抗生物質	劇
院外採用	アルロイドG内用液5%	消化性潰瘍用剤	

両採用	アルロイドG顆粒溶解用67%	消化性潰瘍用剤	
院外採用	アルンブリグ錠30mg	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤	劇
院外採用	アルンブリグ錠90mg	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤	劇
院外採用	アレギサル錠10mg	アレルギー性疾患治療剤	
院外採用	アレグラ錠30mg	アレルギー性疾患治療剤	
院外採用	アレグラ錠60mg	アレルギー性疾患治療剤	
院外採用	アレジオンL X点眼液0.1%	抗アレルギー点眼剤	
院外採用	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	持続性・経眼瞼アレルギー性結膜炎治療剤	
院外採用	アレジオン錠10	アレルギー性疾患治療剤	
院外採用	アレジオン錠20	アレルギー性疾患治療剤	
院外採用	アレジオン点眼液0.05%	抗アレルギー点眼剤	
両採用	アレセンサカプセル150mg	抗悪性腫瘍剤/ALK阻害剤	劇
両採用	アレピアチン散10%	抗てんかん剤	劇
院外採用	アレピアチン錠100mg	抗てんかん剤	
両採用	アレピアチン注250mg	抗けいれん剤	劇
院外採用	アレロックOD錠2.5	アレルギー性疾患治療剤	
院外採用	アレロックOD錠5	アレルギー性疾患治療剤	
院外採用	アレロック錠2.5	アレルギー性疾患治療剤	
院外採用	アレロック錠5	アレルギー性疾患治療剤	
院外採用	アレロック顆粒0.5%	アレルギー性疾患治療剤	
院外採用	アレンドロン酸錠35mg「VTRS」	骨粗鬆症治療剤	劇
両採用	アレンドロン酸錠35mg「トーフ」	骨粗鬆症治療剤	劇
院外採用	アローゼン顆粒	緩下剤	
両採用	アロカリス点滴静注235mg	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤	劇
院外採用	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	高血圧症・狭心症・不整脈・本態性振戦治療剤	
院外採用	アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」	高血圧症・狭心症・不整脈・本態性振戦治療剤	
院外採用	アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」	高血圧症・狭心症・不整脈・本態性振戦治療剤	
院外採用	アロフト錠20mg	筋緊張性疾患治療剤	
院外採用	アロプリノール100mg錠	高尿酸血症治療剤	
両採用	アロプリノール錠100mg「NIG」	高尿酸血症治療剤	
院外採用	アロプリノール錠100mg「サワイ」	高尿酸血症治療剤	
両採用	アロマシン錠25mg	アロマターゼ阻害剤/閉経後乳癌治療剤	
両採用	アロンアルファA「三共」	外科用接着剤	
院外採用	アンカロン錠100	不整脈治療剤	
院外採用	アンコチル錠500mg	深在性真菌症治療剤	劇
院外採用	アンテベートクリーム0.05%	外用副腎皮質ホルモン剤	劇
院外採用	アンテベートローション0.05%	外用副腎皮質ホルモン剤	劇
院外採用	アンテベート軟膏0.05%	外用副腎皮質ホルモン剤	劇
両採用	アンヒバ坐剤小児用100mg	小児用解熱鎮痛剤	
両採用	アンヒバ坐剤小児用200mg	小児用解熱鎮痛剤	
両採用	アンヒバ坐剤小児用50mg	小児用解熱鎮痛剤	
院外採用	アンブラーグ錠100mg	5-HT2ブロッカー	
院外採用	アンブラーグ錠50mg	5-HT2ブロッカー	
両採用	アンプロキシソール塩酸塩錠15mg「トーフ」	気道潤滑去たん剤	
両採用	アンベック坐剤10mg	癌疼痛治療剤	麻劇
両採用	アンベック坐剤30mg	癌疼痛治療剤	麻劇
院外採用	イーケプラドライシロップ50%	抗てんかん剤	
院外採用	イーケプラ錠250mg	抗てんかん剤	
院外採用	イーケプラ錠500mg	抗てんかん剤	
院外採用	イーフェンバカル錠100μg	口腔粘膜吸収癌疼痛治療剤	麻劇
院外採用	イーフェンバカル錠50μg	口腔粘膜吸収癌疼痛治療剤	麻劇
院外採用	イオウ・カンフルローション「東豊」	皮膚軟化剤	
両採用	イオパミドール300注100mL「F」	非イオン性尿路・血管造影剤	
両採用	イオパミドール300注20mL「F」	非イオン性尿路・血管造影剤	

両採用	イオパミドール300注シリンジ100mL「F」	非イオン性尿路・血管造影剤	
両採用	イオパミドール300注シリンジ150mL「F」	非イオン性尿路・血管造影剤	
両採用	イオパミドール370注100mL「F」	非イオン性尿路・血管造影剤	
両採用	イオパミドール370注50mL「F」	非イオン性尿路・血管造影剤	
両採用	イオフエタミン(123I)注射液「第一」	局所脳血流診断薬	
両採用	イオヘキソール240注シリンジ100mL「F」	非イオン性造影剤	
両採用	イオヘキソール300注20mL「F」	非イオン性造影剤	
両採用	イオヘキソール350注シリンジ100mL「F」	非イオン性造影剤	
両採用	イグザレルトOD錠10mg	選択的直接作用型第Xa因子阻害剤	
両採用	イグザレルトOD錠15mg	選択的直接作用型第Xa因子阻害剤	
院外採用	イグザレルト錠15mg	選択的直接作用型第Xa因子阻害剤	
院外採用	イグザレルト錠2.5mg	選択的直接作用型第Xa因子阻害剤	
両採用	イクスタンジ錠40mg	前立腺癌治療剤	劇
院外採用	イクセロンパッチ4.5mg	アルツハイマー型認知症治療剤	劇
両採用	イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」	EPA製剤	
院外採用	イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」	EPA製剤	
両採用	イジユド点滴静注300mg	抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗ヒトCTLA-4モノクローナル抗体	劇
院外採用	イスコチン原末	結核化学療法剤	
両採用	イスコチン錠100mg	結核化学療法剤	
両採用	イスコチン注100mg	結核化学療法剤	
両採用	イストダックス点滴静注用10mg	抗悪性腫瘍剤/ヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)阻害剤	劇
院外採用	イソジンガーグル液7%	含嗽剤	
両採用	イソジンゲル10%	殺菌消毒剤	
両採用	イソジンシュガーパスタ軟膏	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	
院外採用	イソジンスクラブ液7.5%	殺菌消毒剤	
院外採用	イソジン液10%	殺菌消毒剤	
院外採用	イソバイドシロップ70%	浸透圧利尿・メニエル病改善剤	
両採用	イソバイドシロップ70%分包30mL	浸透圧利尿・メニエル病改善剤	
両採用	イソピスト注240	非イオン性脳槽・脊髄・関節造影剤	
両採用	イダマイシン静注用5mg	抗腫瘍性抗生物質製剤	
両採用	イトラコナゾール錠50mg「日医工」	抗真菌剤	
両採用	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	抗真菌剤	
院外採用	イトリゾールカプセル50	抗真菌剤	
院外採用	イトリゾール内用液1%	抗真菌剤	
両採用	イナビル吸入粉末剤20mg	長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤	
院外採用	イニシンク配合錠	2型糖尿病治療剤	劇
両採用	イノバン注0.3%シリンジ	急性循環不全改善剤	劇
院外採用	イノラス配合経腸用液	経腸栄養剤	
院外採用	イノレット30R注	インスリン製剤	劇
両採用	イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トロー」	骨粗鬆症治療剤	劇
院外採用	イフェクサーSRカプセル37.5mg	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤	劇
両採用	イフェクサーSRカプセル75mg	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤	劇
両採用	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	鎮暈剤	
院外採用	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医工」	鎮暈剤	
両採用	イブランス錠125mg	抗悪性腫瘍剤/CDK4/6阻害剤	劇
両採用	イブランス錠25mg	抗悪性腫瘍剤/CDK4/6阻害剤	劇
両採用	イベニティ皮下注105mgシリンジ	ヒト化抗スクレロシンモノクローナル抗体製剤	
両採用	イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼインヒビター	劇
両採用	イミグラン錠50	片頭痛治療剤	劇
院外採用	イミグラン点鼻液20	片頭痛治療剤	劇

両採用	イミフィンジ点滴静注120mg	抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗ヒトPD-L1モノクローナル抗体	劇
両採用	イミフィンジ点滴静注500mg	抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗ヒトPD-L1モノクローナル抗体	劇
両採用	イムノブラダー膀胱注用80mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両採用	イムブルピカカプセル140mg	抗悪性腫瘍剤/プルトン型チロシンキナーゼ阻害剤	劇
両採用	イムラン錠50mg	免疫抑制剤	
院外採用	イメンドカプセル125mg	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤	
院外採用	イメンドカプセル80mg	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤	
両採用	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」	抗悪性腫瘍剤	劇
両採用	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」	抗悪性腫瘍剤	劇
院外採用	イリボーOD錠2.5μg	下痢型過敏性腸症候群治療剤	劇
院外採用	イリボー錠5μg	下痢型過敏性腸症候群治療剤	劇
院外採用	イルトラ配合錠HD	長時間作用型ARB/利尿薬合剤	
院外採用	イルトラ配合錠LD	長時間作用型ARB/利尿薬合剤	
両採用	イルベサルタン錠50mg「DSPB」	長時間作用型ARB	
院外採用	イルベタン錠100mg	長時間作用型ARB	
院外採用	イルベタン錠200mg	長時間作用型ARB	
院外採用	イルベタン錠50mg	長時間作用型ARB	
院外採用	イレッサ錠250	抗悪性腫瘍剤/上皮成長因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤	劇
両採用	インクレミンシロップ5%	鉄欠乏性貧血治療剤	
両採用	インジウムDTPA(111In)注	脳脊髄液腔病変診断薬	
両採用	インジゴカルミン注20mg「AFP」	腎機能検査用薬/センチネルリンパ節同定用薬	
院外採用	インスリン アスパルトBS注ソロスターNR「サノファイ」	超速効型インスリンアナログ製剤	劇
両採用	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	持効型溶解インスリンアナログ製剤	劇
両採用	インタール吸入液1%	喘息治療剤	
院外採用	インテバンクリーム1%	経皮鎮痛消炎剤	
両採用	インデラル錠10mg	高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤	劇
両採用	インデラル注射液2mg	β遮断性不整脈・狭心症治療剤	劇
院外採用	インドメタシンパップ70mg「BMD」	経皮吸収型鎮痛消炎剤	
両採用	イントラリポス輸液10%	脂肪乳剤	
院外採用	インフリーSカプセル200mg	組織活性化鎮痛・抗炎症剤	劇
両採用	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤	劇
両採用	インライタ錠1mg	抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤	劇
両採用	インライタ錠5mg	抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤	劇
両採用	ヴィーン3G輸液	ブドウ糖加酢酸維持液	
院外採用	ウェールナラ配合錠	閉経後骨粗鬆症治療剤	
両採用	ヴォトリエント錠200mg	抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤	劇
両採用	ウチダのシテイM	生薬	
両採用	ウブレチド錠5mg	コリンエステラーゼ阻害薬	
両採用	ウラリット-U配合散	アルカリ化療法剤/酸性尿・アシドーシス改善剤	
院外採用	ウラリット配合錠	アルカリ化療法剤/酸性尿・アシドーシス改善剤	
院外採用	ウリアデック錠20mg	高尿酸血症治療剤	
院外採用	ウリアデック錠40mg	高尿酸血症治療剤	
院外採用	ウリアデック錠60mg	高尿酸血症治療剤	
院外採用	ウリンメット配合錠	アルカリ化療法剤/酸性尿・アシドーシス改善剤	
両採用	ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」	肝・胆・消化機能改善剤	
院外採用	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	肝・胆・消化機能改善剤	
院外採用	ウルソ錠100mg	肝・胆・消化機能改善剤	
院外採用	ウルソ錠50mg	肝・胆・消化機能改善剤	
両採用	ウルティプロ吸入用カプセル	長時間作用性吸入気管支拡張配合剤	
両採用	ウレパールクリーム10%	角化症治療剤	

両採用	ウレパールローション10%	角化症治療剤	
院外採用	ウロカルン錠225mg	尿路結石治療剤	
両採用	ウログラフィン注60%	直接膵管胆道・唾液腺造影剤	
両採用	ウロナーゼ静注用6万単位	線維素溶解酵素剤	
両採用	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	泌尿器科用灌流液	
両採用	ウロミテキサン注400mg	イホスファミド・シクロホスファミド泌尿器系障害発現抑制剤	
院外採用	エイゾプト懸濁性点眼液1%	眼圧下降剤	
院外採用	エイベリス点眼液0.002%	緑内障・高眼圧症治療剤	劇
院外採用	エースコール錠1mg	胆汁・腎排泄型ACE阻害剤	
院外採用	エースコール錠2mg	胆汁・腎排泄型ACE阻害剤	
院外採用	エカード配合錠HD	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬/利尿薬配合剤	
両採用	エキザルベ	皮膚疾患治療剤	
院外採用	エクア錠50mg	2型糖尿病治療薬	
両採用	エクザール注射用10mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両採用	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液	
両採用	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液	
両採用	エクセグラン散20%	抗てんかん剤	劇
両採用	エクセグラン錠100mg	抗てんかん剤	劇
院外採用	エクセルダームクリーム1%	抗真菌剤	
院外採用	エクメット配合錠HD	2型糖尿病治療剤	劇
院外採用	エクメット配合錠LD	2型糖尿病治療剤	劇
院外採用	エクラープラスター20μg/cm <sup>2</sup>	外用副腎皮質ホルモン剤	
院外採用	エクリラ400μgジェヌエア30吸入用	COPD治療剤	
院外採用	エサンプトール錠250mg	エタンプトール製剤	劇
両採用	エジュラント錠25mg	抗ウイルス化学療法剤	劇
両採用	エスクレ坐剤「250」	催眠鎮静剤	
両採用	エスクレ坐剤「500」	催眠鎮静剤	
両採用	エシタロプラム錠10mg「サワイ」	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	劇
両採用	エズピクロン錠2mg「トーワ」	不眠症治療剤	
院外採用	エストラーナテープ0.72mg	経皮吸収型エストラジオール製剤	
院外採用	エストラサイトカプセル156.7mg	前立腺癌治療剤	劇
院外採用	エストリール錠0.5mg	卵胞ホルモン製剤	
院外採用	エストリール錠1mg*(持田)	卵胞ホルモン製剤	
両採用	エストリール錠0.5mg	卵胞ホルモン剤	
両採用	エスポー皮下用24000シリンジ	ヒトエリスロポエチン製剤	劇
両採用	エスワンタイホウ配合OD錠T20	代謝拮抗剤	劇
両採用	エスワンタイホウ配合OD錠T25	代謝拮抗剤	劇
両採用	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	高脂血症治療剤	
両採用	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	プロトンポンプ・インヒビター	
両採用	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	脳保護剤	
両採用	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	精神安定剤	精3
院外採用	エチゾラム錠0.5mg「アメル」	精神安定剤	精3
院外採用	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」	精神安定剤	精3
院外採用	エックスフォージ配合OD錠	選択的AT1受容体ブロッカー/持続性Ca拮抗薬合剤	劇
院外採用	エックスフォージ配合錠	選択的AT1受容体ブロッカー/持続性Ca拮抗薬合剤	劇
院外採用	エディロールカプセル0.5μg	骨粗鬆症治療剤	劇
院外採用	エディロールカプセル0.75μg	骨粗鬆症治療剤	劇
両採用	エトポシド点滴静注液100mg「SN」	抗悪性腫瘍剤	劇
両採用	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	抗悪性腫瘍剤	劇
両採用	エドルミズ錠50mg	グレリン様作用薬	劇
両採用	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」	持続性ACE阻害剤	
院外採用	エネマスター注腸散	注腸用X線造影剤	

院外採用	エバステルOD錠10mg	持続性選択H1受容体拮抗剤	
院外採用	エバステルOD錠5mg	持続性選択H1受容体拮抗剤	
院外採用	エバステル錠10mg	持続性選択H1受容体拮抗剤	
院外採用	エバステル錠5mg	持続性選択H1受容体拮抗剤	
院外採用	エバデールS300	EPA製剤	
院外採用	エバデールS600	EPA製剤	
院外採用	エバデールS900	EPA製剤	
院外採用	エバデールカプセル300	EPA製剤	
院外採用	エビスタ錠60mg	骨粗鬆症治療剤	
院外採用	エビナスチン塩酸塩錠20mg「日医工」	アレルギー性疾患治療剤	
両採用	エビペン注射液0.15mg	アナフィラキシー補助治療剤	劇
両採用	エビペン注射液0.3mg	アナフィラキシー補助治療剤	劇
院外採用	エビリファイ錠3mg	抗精神病剤	劇
両採用	エビルピシン塩酸塩注射液10mg「NK」	抗腫瘍性抗生物質製剤	劇
両採用	エビルピシン塩酸塩注射液50mg「NK」	抗腫瘍性抗生物質製剤	劇
院外採用	エピレオプチマル散50%	てんかん小発作治療剤	
両採用	エフィエントOD錠20mg	抗血小板剤	
両採用	エフィエント錠3.75mg	抗血小板剤	
院外採用	エフィエント錠5mg	抗血小板剤	
両採用	エプキンリ皮下注48mg	抗悪性腫瘍剤/二重特異性抗体製剤	劇
両採用	エプキンリ皮下注4mg	抗悪性腫瘍剤/二重特異性抗体製剤	劇
両採用	エプジコム配合錠	抗ウイルス化学療法剤	劇
院外採用	エプトール125mg錠	エタンプトール製剤	劇
両採用	エプトール250mg錠	エタンプトール製剤	劇
院外採用	エフピーOD錠2.5	パーキンソン病治療剤	劇
両採用	エブランチルカプセル15mg	排尿障害改善・降圧剤	
院外採用	エブランチルカプセル30mg	排尿障害改善・降圧剤	
両採用	エブレノン錠50mg「杏林」	選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬	
両採用	エベリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	筋緊張症候改善剤	
院外採用	エベレンゾ錠100mg	腎性貧血治療薬	劇
両採用	エベレンゾ錠20mg	腎性貧血治療薬	劇
両採用	エベレンゾ錠50mg	腎性貧血治療薬	劇
院外採用	エボザックカプセル30mg	口腔乾燥症状改善剤	
両採用	エボジン注シリンジ750	遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤	劇
両採用	エホチール注10mg	昇圧剤	劇
両採用	エポルトラ点滴静注20mg	抗悪性腫瘍剤	劇
院外採用	エミレース錠10mg	抗精神病剤	劇
両採用	エムプリシティ点滴静注用300mg	抗悪性腫瘍剤/ヒト化抗ヒトSLAMF7モノクローナル抗体	劇
両採用	エムプリシティ点滴静注用400mg	抗悪性腫瘍剤/ヒト化抗ヒトSLAMF7モノクローナル抗体	劇
院内採用	エムラクリーム	局所麻酔剤	劇
院内採用	エムラパッチ	局所麻酔剤	劇
両採用	エリキユース錠2.5mg	経口FXa阻害剤	
院外採用	エリキユース錠5mg	経口FXa阻害剤	
院外採用	エリスロシンドライシロップ10%	マクロライド系抗生物質	
両採用	エリスロシンドライシロップW20%	マクロライド系抗生物質	
院外採用	エリスロシン錠100mg	マクロライド系抗生物質	
両採用	エリスロシン錠200mg	マクロライド系抗生物質	
両採用	エリプリンメシル酸塩静注液1mg「ニプロ」	抗悪性腫瘍剤	
両採用	エルカトニン筋注20単位「TBP」	骨粗鬆症治療剤	劇
両採用	エルカトニン注40単位「TBP」	合成カルシトニン誘導体制剤	劇
院外採用	エルカルチンFF錠250mg	レボカルニチン製剤	
院外採用	エルカルチンFF内用液10%	レボカルニチン製剤	

両採用	エルデカルシトールカプセル0.75 $\mu$ g「サワイ」	骨粗鬆症治療剤	劇
両採用	エルネオパNF1号輸液	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液	
両採用	エルネオパNF2号輸液	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液	
両採用	エルレフィオ皮下注44mg	抗悪性腫瘍剤/抗BCMA/CD3二重特異性抗体	劇
両採用	エルレフィオ皮下注76mg	抗悪性腫瘍剤/抗BCMA/CD3二重特異性抗体	劇
両採用	エルロチニブ錠100mg「NK」	抗悪性腫瘍剤/上皮増殖因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤	劇
両採用	エルロチニブ錠150mg「NK」	抗悪性腫瘍剤/上皮増殖因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤	劇
両採用	エレジェクト注シリンジ	高カロリー輸液用微量元素製剤	
両採用	エレンタール配合内用剤	成分栄養剤	
院外採用	エンクラッセ62.5 $\mu$ gエリプタ30吸入用	長時間作用性吸入気管支拡張剤	
両採用	エンシュア・H	経腸栄養剤	
院外採用	エンシュア・リキッド	経腸栄養剤	
両採用	エンタイビオ点滴静注用300mg	ヒト化抗ヒト $\alpha$ 4 $\beta$ 7インテグリンモノクローナル抗体製剤	劇
両採用	エンタイビオ皮下注108mgペン	ヒト化抗ヒト $\alpha$ 4 $\beta$ 7インテグリンモノクローナル抗体製剤	劇
両採用	エンテカビル錠0.5mg「EE」	抗ウイルス化学療法剤	劇
両採用	エンドキサン錠50mg	アルキル化剤	劇
両採用	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	完全ヒト型可溶性TNF $\alpha$ /LT $\alpha$ レセプター製剤	劇
院外採用	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	完全ヒト型可溶性TNF $\alpha$ /LT $\alpha$ レセプター製剤	劇
両採用	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	完全ヒト型可溶性TNF $\alpha$ /LT $\alpha$ レセプター製剤	劇
院外採用	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	完全ヒト型可溶性TNF $\alpha$ /LT $\alpha$ レセプター製剤	劇
院外採用	エンベシドクリーム1%	抗真菌剤	
両採用	エンレスト錠100mg	アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬	
院外採用	エンレスト錠200mg	アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬	
院外採用	エンレスト錠50mg	アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬	
院外採用	オイグルコン錠1.25mg	血糖降下剤	劇
院外採用	オイグルコン錠2.5mg	血糖降下剤	劇
両採用	オイラックスHクリーム	鎮痒・消炎剤	
両採用	オイラックスクリーム10%	鎮痒剤	
院外採用	オーグメンチン配合錠125SS	複合抗生物質	
両採用	オーグメンチン配合錠250RS	複合抗生物質	
両採用	オーツカMV注	経中心静脈栄養輸液用総合ビタミン剤	
両採用	オキサリプラチン点滴静注液100mg「サワイ」	抗悪性腫瘍剤	
両採用	オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「ホスピーラ」	抗悪性腫瘍剤	
両採用	オキサリプラチン点滴静注液200mg「サワイ」	抗悪性腫瘍剤	
両採用	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ホスピーラ」	抗悪性腫瘍剤	
両採用	オキサリプラチン点滴静注液50mg「サワイ」	抗悪性腫瘍剤	
院外採用	オキサロール軟膏25 $\mu$ g/g	角化症治療剤	劇
院外採用	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	持続性癌疼痛治療剤	麻劇
両採用	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	持続性癌疼痛治療剤	麻劇
両採用	オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」	持続性癌疼痛治療剤	麻劇
両採用	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	持続性癌疼痛治療剤	麻劇
院外採用	オキシコドン錠2.5mgNX「第一三共」	癌疼痛治療剤	麻劇
院外採用	オキシコドン錠5mgNX「第一三共」	癌疼痛治療剤	麻劇
両採用	オキシコドン内服液10mg「日本臓器」	癌疼痛治療用剤	麻劇
院外採用	オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」	癌疼痛治療用剤	麻劇
院外採用	オキシコドン内服液5mg「日本臓器」	癌疼痛治療用剤	麻劇

両採用	オキシコンチンTR錠10mg	持続性癌疼痛治療剤	麻劇
両採用	オキシドール	殺菌消毒剤	
両採用	オキシドール消毒用液「マルイシ」	殺菌消毒剤	
両採用	オキノーム散10mg	癌疼痛治療用剤	麻劇
両採用	オキノーム散2.5mg	癌疼痛治療用剤	麻劇
両採用	オキノーム散20mg	癌疼痛治療用剤	麻劇
両採用	オキノーム散5mg	癌疼痛治療用剤	麻劇
両採用	オクトレオチド皮下注50μg「あすか」	持続性ソマトスタチンアナログ製剤	劇
院外採用	オステラック錠100	非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤	劇
院外採用	オステラック錠200	非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤	劇
院外採用	オゼックス細粒小児用15%	ニューキノロン系経口抗菌製剤	
院外採用	オゼックス錠150	ニューキノロン系経口抗菌製剤	
両採用	オセルタミビルDS3%「サワイ」	抗インフルエンザウイルス剤	
両採用	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	抗インフルエンザウイルス剤	
院外採用	オゼンピック皮下注0.25mgSD	2型糖尿病治療剤	劇
院外採用	オゼンピック皮下注0.5mgSD	2型糖尿病治療剤	劇
院外採用	オゼンピック皮下注1.0mgSD	2型糖尿病治療剤	劇
院外採用	オゼンピック皮下注2mg	2型糖尿病治療剤	劇
両採用	オダイン錠125mg	前立腺癌治療剤	劇
院外採用	オテズラ錠10mg	PDE4阻害剤	劇
院外採用	オテズラ錠20mg	PDE4阻害剤	劇
院外採用	オテズラ錠30mg	PDE4阻害剤	劇
院外採用	オデフシ配合錠	抗ウイルス化学療法剤	劇
両採用	オニバイド点滴静注43mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両採用	オノアクト点滴静注50mg	短時間作用型β1選択的遮断剤	劇
院外採用	オノンカプセル112.5mg	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤	
院外採用	オノンドライシロップ10%	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤	
院外採用	オパルモン錠5μg	PGE1誘導体制剤	
両採用	オフェブカプセル100mg	抗線維化剤	劇
院外採用	オフェブカプセル150mg	抗線維化剤	劇
両採用	オブジーボ点滴静注120mg	抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体	劇
両採用	オブジーボ点滴静注240mg	抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体	劇
院内採用	オブソ内服液10mg	癌疼痛治療剤	麻劇
両採用	オブソ内服液5mg	癌疼痛治療剤	麻劇
両採用	オムニパーク300注シリンジ100mL	非イオン性造影剤	
両採用	オムニパーク300注シリンジ125mL	非イオン性造影剤	
院外採用	オメプラール錠10	プロトンポンプ・インヒビター	
院外採用	オメプラール錠20	プロトンポンプ・インヒビター	
院外採用	オメプラゾール錠20mg「アメル」	プロトンポンプ・インヒビター	
両採用	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	プロトンポンプ・インヒビター	
院外採用	オメプラゾン錠20mg	プロトンポンプ・インヒビター	
院外採用	オラビ錠口腔用50mg	口腔粘膜付着型口腔咽頭カンジダ症治療剤	
両採用	オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」	抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤	劇
院外採用	オリブ油*（フヂミ）	軟膏基剤	
両採用	オリブ油*（丸石）	軟膏基剤	
両採用	オルケディア錠1mg	カルシウム受容体作動薬	劇
両採用	オルケディア錠2mg	カルシウム受容体作動薬	劇
院外採用	オルケディア錠4mg	カルシウム受容体作動薬	劇
両採用	オルダミン注射用1g	食道静脈瘤硬化療法・胃静脈瘤退縮・静脈奇形硬化療法剤	劇
院外採用	オルベスコ100μgインヘラー112吸入用	吸入ステロイド喘息治療剤	
院外採用	オルベスコ100μgインヘラー56吸入用	吸入ステロイド喘息治療剤	

院外採用	オルベスコ200 $\mu$ gインヘラー56吸入用	吸入ステロイド喘息治療剤	
院外採用	オルベスコ50 $\mu$ gインヘラー112吸入用	吸入ステロイド喘息治療剤	
両採用	オルミエント錠2mg	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤	劇
院外採用	オルミエント錠4mg	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤	劇
両採用	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	高親和性AT1レセプターブロッカー	
院外採用	オルメテックOD錠10mg	高親和性AT1レセプターブロッカー	
院外採用	オルメテックOD錠20mg	高親和性AT1レセプターブロッカー	
院外採用	オルメテックOD錠40mg	高親和性AT1レセプターブロッカー	
院外採用	オルメテックOD錠5mg	高親和性AT1レセプターブロッカー	
両採用	オレンシア点滴静注用250mg	T細胞選択的共刺激調節剤	劇
院外採用	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	T細胞選択的共刺激調節剤	劇
両採用	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	アレルギー性疾患治療剤	
両採用	オロパタジン点眼液0.1%「サンド」	抗アレルギー点眼剤	
院外採用	オングリザ錠2.5mg	2型糖尿病治療剤	
院外採用	オングリザ錠5mg	2型糖尿病治療剤	
両採用	オンコピン注射用1mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両採用	オンジェンティス錠25mg	末梢COMT阻害剤	劇
両採用	オندانセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	5-HT3受容体拮抗型制吐剤	劇
両採用	オンプレス吸入用カプセル150 $\mu$ g	長時間作用性吸入気管支拡張剤	
両採用	オンポー点滴静注300mg	ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤	劇
両採用	オンポー皮下注100mgオートインジェクター	ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤	劇
両採用	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ		劇
両採用	カーディオライト注射液 第一	心臓疾患・心機能・副甲状腺疾患診断薬	
両採用	カーディオライト注射液 第一	心臓疾患・心機能・副甲状腺疾患診断薬	
両採用	カイトリル点滴静注バッグ3mg/100mL	5-HT3受容体拮抗型制吐剤	劇
両採用	カイプロリス点滴静注用10mg	抗悪性腫瘍剤/プロテアソーム阻害剤	
両採用	カイプロリス点滴静注用40mg	抗悪性腫瘍剤/プロテアソーム阻害剤	
両採用	ガザイバ点滴静注1000mg	抗悪性腫瘍剤/ヒト化抗CD20モノクローナル抗体	劇
院外採用	ガスコンドロップ内用液2%	胃内有泡性粘液除去剤	
院外採用	ガスコン錠40mg	消化管内ガス駆除剤	
院外採用	ガスターD錠10mg	H2受容体拮抗剤	
院外採用	ガスターD錠20mg	H2受容体拮抗剤	
院外採用	ガスター散10%	H2受容体拮抗剤	
院外採用	ガスター錠10mg	H2受容体拮抗剤	
院外採用	ガスター錠20mg	H2受容体拮抗剤	
両採用	ガストローム顆粒6.7%	胃炎・胃潰瘍治療剤	
両採用	ガストログラフィン経口・注腸用	水溶性消化管造影剤	
院外採用	ガスマチン散1%	消化管運動機能改善剤	
院外採用	ガスマチン錠2.5mg	消化管運動機能改善剤	
院外採用	ガスマチン錠5mg	消化管運動機能改善剤	
院外採用	ガスロンN・OD錠4mg	粘膜防御性胃炎・胃潰瘍治療剤	
院外採用	カソデックスOD錠80mg	前立腺癌治療剤	劇
院外採用	カソデックス錠80mg	前立腺癌治療剤	劇
院外採用	カタプレス錠75 $\mu$ g	高血圧症治療剤	
院外採用	ガチフロ点眼液0.3%	広範囲抗菌点眼剤	
両採用	カチリ「ヨシダ」	鎮痒・収斂・消炎剤	
両採用	カデックス軟膏0.9%	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	
院外採用	カデュエット配合錠1番	持続性Ca拮抗薬/HMG-CoA還元酵素阻害剤	劇
院外採用	カデュエット配合錠3番	持続性Ca拮抗薬/HMG-CoA還元酵素阻害剤	劇
院外採用	カデュエット配合錠4番	持続性Ca拮抗薬/HMG-CoA還元酵素阻害剤	劇
両採用	カドサイラ点滴静注用100mg	抗HER2抗体チューブリン重合阻害剤複合体	劇
両採用	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ10mL「GE」	環状型MRI造影剤	

両採用	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」	環状型MRI用造影剤	
院外採用	カトレップテープ70mg	経皮鎮痛消炎剤	
両採用	カトレップパップ70mg	鎮痛消炎剤	
院外採用	カナグルOD錠100mg	SGLT2阻害剤	
院外採用	カナグル錠100mg	SGLT2阻害剤	
院外採用	ガナトン錠50mg	消化管運動賦活剤	
院外採用	カナマイシンカプセル250mg「明治」	アミノグリコシド系抗生物質	
院外採用	カナリア配合錠	2型糖尿病治療剤	
院外採用	カバサル錠0.25mg	ドパミン作動薬	劇
院外採用	ガバベン錠200mg	抗てんかん剤	
院外採用	ガバベン錠400mg	抗てんかん剤	
両採用	カプトリル錠12.5mg	レニン・アンジオテンシン系降圧剤	
両採用	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」	蛋白分解酵素阻害剤	劇
両採用	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」	蛋白分解酵素阻害剤	劇
両採用	カベシタピン錠300mg「ヤクルト」	抗悪性腫瘍剤	劇
院外採用	カボメティクス錠20mg	抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤	劇
両採用	カモスタットメシル酸塩錠100mg「JG」	蛋白分解酵素阻害剤	
院外採用	ガラクターゼ散50%	乳糖分解酵素製剤	
両採用	ガラタミンOD錠8mg「DSEP」	アルツハイマー型認知症治療剤	劇
院外採用	カリメートドライシロップ92.59%	血清カリウム抑制剤	
両採用	カリメート経口液20%	血清カリウム抑制剤	
院外採用	カリメート散	血清カリウム抑制剤	
院外採用	カルグート錠5	心機能改善剤	
院外採用	カルケンスカプセル100mg	抗悪性腫瘍剤/プルトン型チロシンキナーゼ阻害剤	劇
院外採用	カルスロット錠10	持続性Ca拮抗降圧剤	劇
院外採用	カルスロット錠20	持続性Ca拮抗降圧剤	劇
院外採用	カルスロット錠5	持続性Ca拮抗降圧剤	劇
両採用	カルセド注射用20mg	抗悪性腫瘍性抗生物質	劇
両採用	カルセド注射用50mg	抗悪性腫瘍性抗生物質	劇
院外採用	カルタンOD錠500mg	高リン血症治療剤	
院外採用	カルタン錠500	高リン血症治療剤	
両採用	カルチコール注射液8.5%5mL	カルシウム補給剤	
両採用	カルディオダイン注	心疾患診断薬	
院外採用	カルデナリン錠0.5mg	血圧降下剤	
院外採用	カルデナリン錠1mg	血圧降下剤	
院外採用	カルデナリン錠2mg	血圧降下剤	
院外採用	カルデナリン錠4mg	血圧降下剤	
両採用	カルナクリン錠25	循環障害改善剤	
両採用	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	血管強化・止血剤	
両採用	カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「フソー」	止血剤	
院外採用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」	血管強化・止血剤	
院外採用	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	向精神作用性てんかん・躁状態治療剤	
両採用	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	向精神作用性てんかん・躁状態治療剤	
院外採用	カルビスケン錠5mg	高血圧・狭心症・頻脈治療剤	劇
院外採用	カルブロック錠16mg	持続性Ca拮抗剤	
院外採用	カルブロック錠8mg	持続性Ca拮抗剤	
両採用	カルベジロール錠10mg「トーワ」	持続性高血圧・狭心症、慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤	
両採用	カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤	
両採用	カルボシステインDS50%「タカタ」	気道粘液調整・粘膜正常化剤	
両採用	カルボシステインシロップ5%「タカタ」	気道粘液調整・粘膜正常化剤	

院外採用	カルボシステイン錠250mg「サワイ」	気道粘液調整・粘膜正常化剤	
両採用	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	気道粘液調整・粘膜正常化剤	
両採用	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	抗悪性腫瘍剤	
両採用	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	抗悪性腫瘍剤	
両採用	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	抗悪性腫瘍剤	
院外採用	カルメロースナトリウム原末「マルイシ」	下剤	
両採用	カレトラ配合錠	抗ウイルス化学療法剤	劇
両採用	カログラ錠120mg	潰瘍性大腸炎治療剤	劇
院外採用	カロナールシロップ2%	小児用解熱鎮痛剤	劇
両採用	カロナール細粒20%	解熱鎮痛剤	劇
院外採用	カロナール細粒50%	解熱鎮痛剤	劇
両採用	カロナール錠200	解熱鎮痛剤	
院外採用	カロナール錠300	解熱鎮痛剤	
両採用	カロナール錠500	解熱鎮痛剤	劇
両採用	カンサイダス点滴静注用50mg	キャンディン系抗真菌剤	劇
両採用	カンサイダス点滴静注用70mg	キャンディン系抗真菌剤	劇
両採用	ガンシクロピル点滴静注用500mg「VTRS」	抗サイトメガロウイルス化学療法剤	
両採用	カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	
院外採用	カンデサルタン錠4mg「タナベ」	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	
両採用	カンプト点滴静注100mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両採用	カンプト点滴静注40mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両採用	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	水分・電解質代謝改善剤	劇
両採用	キイトルーダ点滴静注100mg	抗悪性腫瘍剤/ヒト化抗ヒトPD-1モノクローナル抗体	劇
院外採用	キサラン点眼液0.005%	緑内障・高眼圧症治療剤	
両採用	キシロカインゼリー2%	粘滑・表面麻酔剤	
両採用	キシロカインビスカス2%	表面麻酔剤	劇
両採用	キシロカインポンプスプレー8%	表面麻酔剤	劇
両採用	キシロカイン液「4%」	表面麻酔剤	
両採用	キシロカイン注ポリアンプ0.5%	局所麻酔剤	劇
両採用	キシロカイン注ポリアンプ0.5%	局所麻酔剤	劇
両採用	キシロカイン注ポリアンプ1%	局所麻酔剤	劇
両採用	キシロカイン注ポリアンプ1%	局所麻酔剤	劇
両採用	キシロカイン注ポリアンプ2%	局所麻酔剤	劇
両採用	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:10000)含有	局所麻酔剤	劇
両採用	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:10000)含有	局所麻酔剤	劇
両採用	キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:8000)含有	局所麻酔剤	劇
両採用	キックリンカプセル250mg	高リン血症治療剤	
院外採用	キックリン顆粒86.2%	高リン血症治療剤	
両採用	キドニーシンチTc-99m注	腎疾患診断薬	
両採用	キドミン輸液	腎不全用アミノ酸製剤	
院外採用	キネダック錠50mg	アルドース還元酵素阻害剤	
院外採用	キプレスOD錠10mg	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤	
院外採用	キプレスチュアブル錠5mg	気管支喘息治療剤	
院外採用	キプレス細粒4mg	気管支喘息治療剤	
院外採用	キプレス錠10mg	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤	
院外採用	キャブピリン配合錠	アスピリン/ボノブラザンフマル酸塩配合剤	
両採用	キュービトル20%皮下注4g/20mL	血漿分画製剤	特生
院外採用	キューバル100エアゾール	吸入ステロイド喘息治療剤	
院外採用	キューピシン静注用350mg	環状リポペプチド系抗生物質製剤	
両採用	キョウニン水「ケンエー」	鎮咳去たん剤	劇

院外採用	キョーリンAP2配合顆粒	鎮痛剤	
両採用	キロサイドN注1g	急性白血病・悪性リンパ腫治療剤	劇
両採用	キロサイドN注400mg	急性白血病・悪性リンパ腫治療剤	劇
両採用	キロサイド注20mg	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤	劇
両採用	キロサイド注60mg	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤	劇
院外採用	キンダベート軟膏0.05%	外用合成副腎皮質ホルモン剤	
両採用	キンダリー透析剤AF2号	人工腎臓用透析液	
両採用	キンダリー透析剤AF3号	人工腎臓用透析液	
両採用	キンダリー透析剤AF3号	人工腎臓用透析液	
両採用	グーフイス錠5mg	胆汁酸トランスポーター阻害剤	
院外採用	クエチアピン錠12.5mg「明治」	抗精神病剤	劇
両採用	クエチアピン錠25mg「トーワ」	抗精神病剤	劇
院外採用	クエチアピン錠25mg「明治」	抗精神病剤	劇
両採用	クエン酸ガリウム(67Ga)注射液	悪性腫瘍・炎症性病変診断薬	
両採用	クエン酸ガリウム-Ga67注射液	悪性腫瘍・炎症性疾患診断薬	
両採用	クエン酸第一鉄Na錠50mg「NIG」	可溶性非イオン型鉄剤	
両採用	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	可溶性非イオン型鉄剤	
両採用	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」	可溶性非イオン型鉄剤	
院外採用	グラアルファ配合点眼液	緑内障・高眼圧症治療剤	
院外採用	グラクティブ錠100mg	糖尿病用剤	
両採用	グラクティブ錠50mg	糖尿病用剤	
院外採用	グラケーカプセル15mg	骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤	
院外採用	クラシエ葛根湯エキス錠T	漢方製剤	
院外採用	グラセプターカプセル0.5mg	免疫抑制剤	劇
院外採用	グラセプターカプセル1mg	免疫抑制剤	劇
両採用	グラナテック点眼液0.4%	緑内障・高眼圧症治療剤	
両採用	グラニセトロン静注液3mg「サワイ」	5-HT3受容体拮抗型制吐剤	劇
両採用	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」	5-HT3受容体拮抗型制吐剤	劇
両採用	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「HK」	5-HT3受容体拮抗型制吐剤	劇
院外採用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	$\beta$ -ラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系抗生物質製剤	
院外採用	クラビット細粒10%	広範囲経口抗菌製剤	
院外採用	クラビット錠250mg	広範囲経口抗菌製剤	
院外採用	クラビット錠500mg	広範囲経口抗菌製剤	
院外採用	クラビット点眼液0.5%	広範囲抗菌点眼剤	
院外採用	クラビット点眼液1.5%	広範囲抗菌点眼剤	
院外採用	グラマリール細粒10%	チアプリド製剤	
院外採用	グラマリール錠25mg	チアプリド製剤	
院外採用	グラマリール錠50mg	チアプリド製剤	
院外採用	クラリシッド錠200mg	マクロライド系抗生物質	
院外採用	クラリシッド錠50mg小児用	マクロライド系抗生物質	
院外採用	クラリスドライシロップ10%小児用	マクロライド系抗生物質	
両採用	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	マクロライド系抗生物質	
院外採用	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	マクロライド系抗生物質	
両採用	クラリスロマイシン錠200mg「大正」	マクロライド系抗生物質	
院外採用	クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	マクロライド系抗生物質	
両採用	クラリスロマイシン錠小児用50mg「タカタ」	マクロライド系抗生物質	
院外採用	クラリス錠200	マクロライド系抗生物質	
院外採用	クラリス錠50小児用	マクロライド系抗生物質	
院外採用	クラリチンドライシロップ1%	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤	
院外採用	クラリチンレディタブ錠10mg	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤	
院外採用	クラリチン錠10mg	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤	
両採用	グランシンジ150	G-CSF製剤	

両採用	グランシリンジ75	G-C S F 製剤	
両採用	グランシリンジM300	G-C S F 製剤	
院外採用	グランダキシ錠50	自律神経調整剤	
両採用	クリアクター静注用80万	血栓溶解剤	
院外採用	クリアナール錠200mg	気道分泌細胞正常化剤	
院外採用	グリクラジド錠20mg「トーワ」	血糖降下剤	劇
院外採用	グリコラン錠250mg	糖尿病用剤	劇
両採用	グリセリン「ケンエー」	調剤用基剤	
両採用	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	頭蓋内圧亢進・頭蓋内浮腫治療剤, 眼圧降下剤	
院内採用	グリセリンBC液60%「ケンエー」		
院外採用	グリセリン洗腸「オヲタ」120	便秘治療剤	
院外採用	グリセリン洗腸「オヲタ」60	便秘治療剤	
院外採用	グリセリン洗腸「オヲタ」小児用30	便秘治療剤	
両採用	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」	便秘治療剤	
院外採用	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」	便秘治療剤	
両採用	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」	便秘治療剤	
院外採用	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」	便秘治療剤	
院外採用	グリチロン配合錠	肝臓疾患・アレルギー用剤	
院外採用	グリベック錠100mg	抗悪性腫瘍剤/チロシキナーゼインヒビター	劇
院外採用	グリミクロンHA錠20mg	S U系経口血糖降下剤	劇
院外採用	グリミクロン錠40mg	S U系経口血糖降下剤	劇
院外採用	グリメサゾン軟膏	グリテール含有副腎皮質ホルモン剤	
両採用	グリメピリドOD錠0.5mg「トーワ」	スルホニルウレア系血糖降下剤	劇
院外採用	グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	スルホニルウレア系血糖降下剤	劇
院外採用	グリメピリド錠0.5mg「VTRS」	スルホニルウレア系血糖降下剤	劇
両採用	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	リンコマイシン系抗生物質	
院外採用	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	リンコマイシン系抗生物質	
両採用	グルアセト35注	維持液	
両採用	グルアセト35注	維持液	
両採用	グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン（遺伝子組換え）製剤	劇
両採用	グルコンサンK細粒4mg/g	カリウム補給剤	
院外採用	グルファスト錠10mg	速効型インスリン分泌促進薬	
院外採用	グルファスト錠5mg	速効型インスリン分泌促進薬	
院外採用	グルベス配合OD錠	速効型インスリン分泌促進薬/食後過血糖改善薬配合剤	
両採用	グレースビット錠50mg	広範囲経口抗菌製剤	
院外採用	クレストールOD錠2.5mg	HMG-CoA還元酵素阻害剤	
院外採用	クレストールOD錠5mg	HMG-CoA還元酵素阻害剤	
院外採用	クレストール錠2.5mg	HMG-CoA還元酵素阻害剤	
院外採用	クレストール錠5mg	HMG-CoA還元酵素阻害剤	
院外採用	クレナフィン瓜外用液10%	爪白癬治療剤	
院外採用	クレメジンカプセル200mg	慢性腎不全用剤	
両採用	クレメジン細粒分包2g	慢性腎不全用剤	
院外採用	クレメジン速崩錠500mg	慢性腎不全用剤	
両採用	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」	心身安定剤	精3
院外採用	クロチアゼパム錠5mg「日医工」	心身安定剤	精3
両採用	クロトリマゾール錠100mg「F」	抗真菌剤	
院外採用	クロピドグレル錠25mg「SANIK」	抗血小板剤	
両採用	クロピドグレル錠25mg「VTRS」	抗血小板剤	
院外採用	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	抗血小板剤	
両採用	クロピドグレル錠75mg「VTRS」	抗血小板剤	
院外採用	クロフェクトン錠25mg	精神神経安定剤	
両採用	グロブリン筋注450mg/3mL「JB」	血漿分画製剤	特生

院外採用	クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」	副腎皮質ホルモン外用剤	
両採用	クロマイ錠100mg	抗生物質製剤	
院外採用	クロモフェロン点眼液2%	アレルギー性結膜炎治療剤	
両採用	ケアラム錠25mg	抗リウマチ剤	劇
両採用	ケイキサレートドライシロップ7.6%	高カリウム血症改善剤	
両採用	ケイキサレート散	高カリウム血症改善剤	
両採用	ケイツーN静注10mg	止血機構賦活ビタミン剤	
両採用	ケイツーシロップ0.2%	ビタミンK2剤	
両採用	ゲーベンクリーム1%	外用感染治療剤	
両採用	ケタスカプセル10mg	気管支喘息・脳血管障害改善剤	
院外採用	ケタス点眼液0.01%	アレルギー性結膜炎治療剤	
両採用	ケタラル静注用200mg	全身麻酔剤	麻劇
両採用	ケトコナゾールクリーム2%「MYK」	抗真菌剤	
院外採用	ケトチフェンカプセル1mg「日医工」	アレルギー性疾患治療剤	
両採用	ゲフィチニブ錠250mg「NK」	抗悪性腫瘍剤／上皮成長因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤	劇
院外採用	ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター	ヒト型抗ヒトIL-6受容体モノクローナル抗体	劇
院外採用	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	ヒト型抗ヒトIL-6受容体モノクローナル抗体	劇
院外採用	ケフラルカプセル250mg	セフェム系抗生物質	
院外採用	ケフラル細粒小児用100mg	セフェム系抗生物質	
両採用	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤	劇
両採用	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤	劇
院外採用	ケレンディア錠10mg	非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬	
院外採用	ケレンディア錠20mg	非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬	
院外採用	ゲンタシンクリーム0.1%	アミノグリコシド系抗生物質	
院外採用	ゲンタシン軟膏0.1%	アミノグリコシド系抗生物質	
両採用	ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」	アミノグリコシド系抗生物質	劇
両採用	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」	アミノグリコシド系抗生物質	
院外採用	ゲンボイヤ配合錠	抗ウイルス化学療法剤	劇
両採用	コアベータ静注用12.5mg	短時間作用型β1選択的遮断剤	劇
両採用	コートリル錠10mg	副腎皮質ホルモン剤	
院内採用	コートロシン注射用0.25mg	合成ACTH製剤	
両採用	ゴービック水性懸濁注シリンジ		劇
院外採用	コールタイジン点鼻液	血管収縮剤	
院外採用	コスパノンカプセル40mg	膵胆道・尿路系鎮痙剤	
院外採用	コスパノン錠40mg	膵胆道・尿路系鎮痙剤	
両採用	コスパノン錠80mg	膵胆道・尿路系鎮痙剤	
両採用	コスメゲン静注用0.5mg	抗腫瘍性抗生物質	劇
両採用	コソプト配合点眼液	緑内障・高眼圧症治療剤	
院外採用	コタロー芍薬甘草湯エキス細粒	漢方製剤	
院外採用	コディオ配合錠EX	選択的AT1受容体ブロッカー／利尿薬合剤	
院外採用	コディオ配合錠MD	選択的AT1受容体ブロッカー／利尿薬合剤	
院外採用	コデインリン酸塩散1%「メタル」	鎮咳剤	劇
院外採用	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	鎮咳剤	麻劇
院外採用	コデインリン酸塩錠20mg「第一三共」	鎮咳剤	麻劇
両採用	ゴナックス皮下注用120mg	前立腺癌治療剤	劇
両採用	ゴナックス皮下注用80mg	前立腺癌治療剤	劇
院外採用	コニール錠2	高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)	劇
院外採用	コニール錠4	高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)	劇
院外採用	コバシル錠2mg	持続性組織ACE阻害剤	
院外採用	コバシル錠4mg	持続性組織ACE阻害剤	

両採用	コムタン錠100mg	末梢COMT阻害剤	
院外採用	コメリアンコーワ錠100	心・腎疾患治療剤	
院外採用	コララン錠2.5mg	HCNチャネル遮断薬	劇
院外採用	コララン錠5mg	HCNチャネル遮断薬	劇
院外採用	コララン錠7.5mg	HCNチャネル遮断薬	劇
院外採用	コランチル配合顆粒	胃炎・消化性潰瘍用剤	
両採用	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	痛風・家族性地中海熱治療剤	劇
院外採用	コレチメント錠9mg	潰瘍性大腸炎治療剤	
院外採用	コレバイン錠500mg	高コレステロール血症治療剤	
院外採用	コロネル細粒83.3%	過敏性腸症候群治療剤	
院外採用	コロネル錠500mg	過敏性腸症候群治療剤	
院外採用	コンサータ錠18mg	中枢神経刺激剤	劇 精1
院外採用	コンサータ錠27mg	中枢神経刺激剤	劇 精1
院外採用	コンサータ錠36mg	中枢神経刺激剤	劇 精1
院外採用	コンスタン0.4mg錠	マイナートランキライザー	精3
両採用	コントミン筋注10mg	精神神経安定剤	劇
院外採用	コントミン糖衣錠100mg	精神神経安定剤	劇
両採用	コントミン糖衣錠12.5mg	精神神経安定剤	
院外採用	コントミン糖衣錠25mg	精神神経安定剤	
両採用	コンバントリンドライシロップ100mg	広域駆虫剤	
両採用	コンビビル配合錠	抗ウイルス化学療法剤	劇
院外採用	コンプラビン配合錠	抗血小板剤	
両採用	サークリサ点滴静注100mg	抗CD38モノクローナル抗体	劇
両採用	サークリサ点滴静注500mg	抗CD38モノクローナル抗体	劇
院外採用	ザーコリカプセル200mg	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤	劇
院外採用	ザーコリカプセル250mg	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤	劇
院内採用	サージカルバック口腔用	歯科用繃帯剤	
院外採用	サーティカン錠0.25mg	免疫抑制剤	劇
院外採用	サーティカン錠0.5mg	免疫抑制剤	劇
院外採用	サアミオン錠5mg	脳循環・代謝改善剤	
院外採用	ザイザルシロップ0.05%	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤	
院外採用	ザイザル錠5mg	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤	
両採用	ザイティガ錠250mg	前立腺癌治療剤/CYP17阻害剤	劇
院外採用	サイトテック錠100	抗NSAID潰瘍剤	劇
両採用	サイトテック錠200	抗NSAID潰瘍剤	劇
院外採用	サイプレジン1%点眼液	屈折能検査点眼剤	
院外採用	ザイボックス錠600mg	オキサゾリジノン系合成抗菌剤	
両採用	サイモグロブリン点滴静注用25mg	免疫抑制剤	劇
両採用	サイラムザ点滴静注液100mg	抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗VEGFR-2モノクローナル抗体	劇
両採用	サイラムザ点滴静注液500mg	抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗VEGFR-2モノクローナル抗体	劇
院外採用	サイレース錠1mg	不眠症治療剤	
両採用	サイレース静注2mg	麻酔導入剤	
院外採用	ザイロリック錠100	高尿酸血症治療剤	
院外採用	ザイロリック錠50	高尿酸血症治療剤	
院外採用	サインバルタカプセル20mg	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤	劇
院外採用	ザクラス配合錠HD	持続性AT1レセプターブロッカー/持続性Ca拮抗薬配合剤	劇
院外採用	ザクラス配合錠LD	持続性AT1レセプターブロッカー/持続性Ca拮抗薬配合剤	劇
院外採用	ザジテンカプセル1mg	アレルギー性疾患治療剤	
院外採用	ザジテンシロップ0.02%	アレルギー性疾患治療剤	
院外採用	ザジテンドライシロップ0.1%	アレルギー性疾患治療剤	

院外採用	ザジテン点眼液0.05%	抗アレルギー点眼剤	
院外採用	ザジテン点鼻液0.05%	アレルギー性鼻炎治療剤	
両採用	ザノサー点滴静注用1g	抗悪性腫瘍剤	劇
両採用	サビーン点滴静注用500mg	アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤の血管外漏出治療剤	劇
院外採用	ザファテック錠100mg	2型糖尿病治療剤	
院外採用	ザファテック錠25mg	2型糖尿病治療剤	
院外採用	ザファテック錠50mg	2型糖尿病治療剤	
両採用	サブバック血液ろ過用補充液-Bi	ろ過型人工腎臓用補液	
院外採用	サムスカOD錠15mg	V2-受容体拮抗剤	劇
院外採用	サムスカOD錠30mg	V2-受容体拮抗剤	劇
両採用	サムスカOD錠7.5mg	V2-受容体拮抗剤	劇
両採用	サムタス点滴静注用8mg	V2-受容体拮抗剤	劇
両採用	サムチレール内用懸濁液15%	ニューモシスチス肺炎治療剤	
院外採用	ザラカム配合点眼液	緑内障・高眼圧症治療剤	
両採用	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	抗リウマチ剤	
院外採用	サラゾピリン錠500mg	潰瘍性大腸炎治療剤	
院外採用	サリグレンカプセル30mg	口腔乾燥症状改善剤	
両採用	サリパラ液	鎮咳去たん剤	
院外採用	サリベートエアゾール	人工唾液	
院外採用	サルタノールインヘラー100μg	定量噴霧式気管支拡張剤	
院外採用	ザルティア錠2.5mg	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤	
院外採用	ザルティア錠5mg	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤	
院外採用	ザルトラップ点滴静注100mg	抗悪性腫瘍剤/VEGF阻害剤	劇
院外採用	ザルトラップ点滴静注200mg	抗悪性腫瘍剤/VEGF阻害剤	劇
両採用	サレドカプセル100	多発性骨髄腫、らい性結節性紅斑、クロウ・深瀬（POMS）症候群治療剤	
両採用	サレドカプセル50	多発性骨髄腫、らい性結節性紅斑、クロウ・深瀬（POMS）症候群治療剤	
院外採用	ザロンチンシロップ5%	抗てんかん剤	
院外採用	サワシリンカプセル250	合成ペニシリン製剤	
院外採用	サワシリン細粒10%	合成ペニシリン製剤	
院外採用	サワシリン錠250	合成ペニシリン製剤	
両採用	サンコバ点眼液0.02%	調節機能改善点眼剤	
両採用	サンディミュン点滴静注用250mg	免疫抑制剤	劇
院外採用	サンディミュン内用液10%	免疫抑制剤	劇
両採用	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	持続性ソマトスタチンアナログマイクロスフェア型徐放性製剤	劇
院外採用	サンピロ点眼液0.5%	緑内障治療剤	劇
両採用	サンピロ点眼液1%	緑内障治療剤	劇
院外採用	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	副腎皮質ホルモン眼耳鼻科用剤	
院外採用	サンリズムカプセル25mg	不整脈治療剤	劇
院外採用	サンリズムカプセル50mg	不整脈治療剤	劇
両採用	サンリズム注射液50	不整脈治療剤	劇
両採用	ジアグノグリーン注射用25mg	肝・循環機能検査用薬/蛍光血管造影剤/センチネルリンパ節同定用薬	
両採用	ジアゼパム錠2mg「アメル」	マイナートランクライザー	精3
院外採用	シアナマイド内用液1%「タナベ」	酒量抑制剤	劇
両採用	ジーラスタ皮下注3.6mgポディーポッド	持続型G-CSF製剤	
院外採用	ジェイゾフト錠25mg	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	劇
院外採用	ジェイゾフト錠50mg	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	劇
院外採用	ジェニナック錠200mg	キノロン系経口抗菌剤	
両採用	ジェプタナ点滴静注60mg	抗悪性腫瘍剤	
院外採用	ジェミーナ配合錠	月経困難症治療剤	
院外採用	ジオトリフ錠20mg	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤	劇

両採用	ジオトリフ錠30mg	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤	劇
両採用	ジオトリフ錠40mg	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤	劇
両採用	ジギラノゲン注0.4mg	強心利尿剤	劇
院外採用	ジクアスLX点眼液3%	ドライアイ治療剤	
院外採用	ジクアス点眼液3%	ドライアイ治療剤	
両採用	ジクトルテープ75mg	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	
院外採用	シグマート錠5mg	狭心症治療剤	
院外採用	シクレスト舌下錠5mg	抗精神病剤	劇
両採用	ジクロード点眼液0.1%	非ステロイド性抗炎症剤	
院外採用	シクロスポリンカプセル50mg「VTRS」	免疫抑制剤	劇
院外採用	シクロスポリン細粒17%「VTRS」	免疫抑制剤	劇
両採用	ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」	経皮鎮痛消炎剤	
両採用	ジクロフェナクNa坐剤12.5mg「日新」	鎮痛・解熱・抗炎症剤	劇
両採用	ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」	鎮痛・解熱・抗炎症剤	劇
両採用	ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」	鎮痛・解熱・抗炎症剤	劇
両採用	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	鎮痛・抗炎症剤	劇
院外採用	ジゴシン錠0.25mg	ジギタリス配糖体製剤	劇
両採用	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	抗悪性腫瘍剤	
両採用	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	抗悪性腫瘍剤	
院外採用	ジスロマックカプセル小児用100mg	15員環マクロライド系抗生物質	
院外採用	ジスロマック細粒小児用10%	15員環マクロライド系抗生物質	
両採用	ジスロマック錠250mg	15員環マクロライド系抗生物質	
院外採用	ジスロマック錠600mg	15員環マクロライド系抗生物質	
両採用	ジスロマック点滴静注用500mg	15員環マクロライド系抗生物質製剤	
院外採用	ジセラカ錠100mg	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤	劇
院外採用	ジセラカ錠200mg	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤	劇
院外採用	ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」	徐放性不整脈治療剤	劇
両採用	ジソピラミド徐放錠150mg「SW」	徐放性不整脈治療剤	劇
両採用	シナール配合錠	ビタミンC・パントテン酸カルシウム配合剤	
院外採用	シナール配合顆粒	ビタミンC・パントテン酸カルシウム配合剤	
院外採用	ジヒドロコデインリン酸塩	鎮咳剤	
両採用	ジヒドロコデインリン酸塩散1%「ホエイ」	鎮咳剤	劇
院外採用	ジピリダモール散12.5%「JG」	冠循環改善剤	
院外採用	ジピリダモール錠100mg「トーワ」	抗血小板剤	
両採用	ジピリダモール錠25mg「トーワ」	冠血管拡張剤, 抗血小板剤	
両採用	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」	抗めまい剤	
院外採用	ジフルカンカプセル100mg	深在性真菌症治療剤	
院外採用	ジフルカンカプセル50mg	深在性真菌症治療剤	
院外採用	ジプレキサ細粒1%	抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤	劇
院外採用	ジプレキサ錠10mg	抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤	劇
院外採用	ジプレキサ錠5mg	抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤	劇
両採用	シプロキササン錠100mg	ニューキノロン系抗菌剤	
両採用	ジプロフィリン注300mg「エーザイ」	強心・喘息治療剤	
院外採用	シベノール錠100mg	不整脈治療剤	劇
両採用	シベノール錠50mg	不整脈治療剤	劇
両採用	シベノール静注70mg	不整脈治療剤	劇
院外採用	シムジア皮下注200mg オートクリックス	ベグヒト化抗ヒトTNF $\alpha$ モノクローナル抗体Fab'断片製剤	劇
両採用	シムピコートターピュヘイラー60吸入	ドライパウダー吸入式喘息・COPD治療配合剤	
両採用	シムレクト静注用20mg	急性拒絶反応抑制剤	劇
両採用	ジメチコン錠40mg「フソー」	消化管内ガス駆除剤	
両採用	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	胃内有泡性粘液除去剤	
院外採用	ジメリン錠250mg	血糖降下剤	劇
両採用	ジャカピ錠10mg	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤	劇

両採用	ジャカピ錠5mg	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤	劇
両採用	ジャディアンス錠10mg	2型糖尿病・慢性心不全・慢性腎臓病治療剤	
両採用	ジャディアンス錠25mg	2型糖尿病治療剤	
院外採用	ジャドニュー顆粒分包360mg	鉄キレート剤	劇
院外採用	ジャドニュー顆粒分包90mg	鉄キレート剤	劇
院外採用	ジャヌビア錠100mg	糖尿病用剤	
院外採用	ジャヌビア錠25mg	糖尿病用剤	
院外採用	ジャヌビア錠50mg	糖尿病用剤	
院外採用	シュアポスト錠0.25mg	速効型インスリン分泌促進剤	劇
院外採用	シュアポスト錠0.5mg	速効型インスリン分泌促進剤	劇
両採用	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ		劇
両採用	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	持続性Ca拮抗剤	
両採用	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	Ca拮抗剤	劇
院外採用	ジルテックドライシロップ1.25%	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤	
院外採用	ジルテック錠10	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤	
院外採用	ジルテック錠5	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤	
両採用	シルニジピン錠5mg「サワイ」	持続性Ca拮抗降圧剤	
院外採用	シロスタゾールOD錠100mg「タカタ」	抗血小板剤	
両採用	シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	抗血小板剤	
両採用	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬	劇
両採用	シングリックス筋注用		劇
院外採用	シングレアチュアブル錠5mg	気管支喘息治療剤	
院外採用	シングレア細粒4mg	気管支喘息治療剤	
院外採用	シングレア錠10mg	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤	
院外採用	シングレア錠5mg	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤	
院外採用	シンバスタチン錠5mg「トーワ」	高脂血症治療剤	
両採用	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	ヒト型抗ヒトTNF $\alpha$ モノクローナル抗体製剤	劇
院外採用	シンメトレル細粒10%	精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤	
両採用	シンメトレル錠50mg	精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤	
院外採用	スイニー錠100mg	2型糖尿病治療剤	
両採用	スインブロイク錠0.2mg	経口末梢性 $\mu$ オピオイド受容体拮抗薬	
院外採用	スーグラ錠25mg	糖尿病治療剤	
院外採用	スーグラ錠50mg	糖尿病治療剤	
院外採用	スージャヌ配合錠	2型糖尿病治療剤	
両採用	スーテントカプセル12.5mg	抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤	劇
両採用	スープレックス吸入麻酔液	全身吸入麻酔剤	劇
両採用	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」	筋弛緩回復剤	
両採用	スキヤンドネストカートリッジ3%	歯科用局所麻酔剤	劇
両採用	スキヤンドネストカートリッジ3%	歯科用局所麻酔剤	劇
両採用	スキリージ点滴静注600mg	ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤	劇
両採用	スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL	ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤	劇
院外採用	スターシス錠30mg	速効型食後血糖降下剤	
院外採用	スターシス錠90mg	速効型食後血糖降下剤	
院外採用	スタデルム軟膏5%	非ステロイド系消炎・鎮痛剤	
両採用	スタラシドカプセル100	抗悪性腫瘍剤	劇
院外採用	スタレボ配合錠L100	抗パーキンソン剤	
院外採用	スチックゼノールA	鎮痛・消炎剤	
両採用	スチバーガ錠40mg	抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤	劇
院外採用	ステープラOD錠0.1mg	過活動膀胱治療剤	
院外採用	ステープラ錠0.1mg	過活動膀胱治療剤	
両採用	ステラーラ点滴静注130mg	ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤	劇

両採用	ステラ-ラ皮下注45mgシリンジ	ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤	劇
両採用	ステリクロンRエタノール液0.5	殺菌消毒剤	
院外採用	ステリクロンR液0.1	殺菌消毒剤	
両採用	ステリクロンW液0.02	殺菌消毒剤	
両採用	ステリクロンW液0.05	殺菌消毒剤	
両採用	ステリクロンW液0.1	殺菌消毒剤	
院外採用	ステロネマ注腸3mg	ディスポーザブルステロイド注腸剤	
院外採用	ストミンA配合錠	耳鳴緩和剤	
院外採用	ストラテラカプセル10mg	注意欠陥/多動性障害治療剤	劇
院外採用	ストラテラカプセル25mg	注意欠陥/多動性障害治療剤	劇
院外採用	ストラテラカプセル40mg	注意欠陥/多動性障害治療剤	劇
院外採用	ストラテラカプセル5mg	注意欠陥/多動性障害治療剤	劇
院外採用	ストラテラ内用液0.4%	注意欠陥/多動性障害治療剤	劇
両採用	ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」	アミノグリコシド系抗生物質	
院外採用	ストロカイン錠5mg	消化管粘膜局所麻酔剤	
院外採用	スパカール錠40mg	膝・胆道疾患治療剤	
両採用	スパニジン点滴静注用100mg	免疫抑制剤	劇
院外採用	スピール膏M	皮膚軟化剤	
両採用	スピオルトレスピマット28吸入	COPD治療配合剤	
院外採用	スピオルトレスピマット60吸入	COPD治療配合剤	
両採用	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	長時間作用性吸入気管支拡張剤	
院外採用	スピリーバ吸入用カプセル18μg	長時間作用性吸入気管支拡張剤	
院外採用	スピロラクトン錠25mg「TCK」	抗アルドステロン性利尿・降圧剤	
両採用	スピロラクトン錠25mg「ト-ワ」	抗アルドステロン性利尿・降圧剤	
院外採用	スピロピタン錠1mg	統合失調症治療剤	劇
両採用	スピロベント錠10μg	持続性気管支拡張・腹圧性尿失禁治療剤	
院外採用	スプリセル錠20mg	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼインヒビター	劇
両採用	スプリセル錠50mg	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼインヒビター	劇
院外採用	スプレキュア点鼻液0.15%	GnRH誘導体制剤	
両採用	スベリア錠200	気道分泌細胞正常化剤	
院外採用	スマイラフ錠50mg	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤	劇
両採用	スミフェロン注DS600万IU	天然型インターフェロンα製剤	劇
両採用	スルバシリン静注用0.75g	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	
両採用	スルバシリン静注用3g	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	
院外採用	スルピリド錠50mg「NIG」	抗潰瘍・精神情動安定剤	
両採用	スルピリド錠50mg「サワイ」	抗潰瘍・精神用剤	
院外採用	セイブル錠25mg	糖尿病食後過血糖改善剤	
院外採用	セイブル錠50mg	糖尿病食後過血糖改善剤	
院外採用	セイブル錠75mg	糖尿病食後過血糖改善剤	
両採用	ゼヴァリン イットリウム(90Y)静注用セット	抗悪性腫瘍剤	劇
両採用	ゼヴァリン インジウム(111In)静注用セット	放射性医薬品/放射標識抗CD20モノクローナル抗体	劇
院外採用	セクターゲル3%	経皮鎮痛消炎剤	
院外採用	ゼスタッククリーム	経皮複合消炎剤	
院外採用	セスデンカプセル30mg	鎮痙・鎮痛剤	
院外採用	ゼチ-ア錠10mg	高脂血症治療剤	
院外採用	セディール錠10mg	セロトニン作動性抗不安剤	劇
院外採用	セディール錠5mg	セロトニン作動性抗不安剤	劇
両採用	セネガシロップ	去たん剤	
両採用	セネガシロップ シオエ	去たん剤	
院外採用	セバゾン錠2	マイナートランクライザー	
両採用	セファクロルカプセル250mg「SW」	セフェム系抗生物質	
両採用	セファゾリンNa注射用1g「イセイ」	合成セファロsporin製剤	
両採用	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	セフェム系抗生物質	

院外採用	セファドール錠25mg	抗めまい剤	
両採用	セファメジンα注射用1g	合成セファロsporin製剤	
院外採用	セファランチン錠1mg	抗アレルギー剤	
両採用	セファランチン注10mg	抗アレルギー剤	劇
院外採用	セファレキシンドライシロップ小児用50%「日医工」	セフェム系抗生物質	
両採用	ゼフィックス錠100	抗ウイルス化学療法剤	劇
両採用	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	セフェム系抗生物質	
両採用	セフォタックス注射用0.5g	セフェム系抗生物質	
両採用	セフォチアム塩酸塩静注用0.5g「NP」	セフェム系抗生物質	
両採用	セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」	セフェム系抗生物質	
両採用	セフカベンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」	セフェム系抗生物質	
両採用	セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	セフェム系抗生物質	
両採用	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「SW」	セフェム系抗生物質	
院外採用	セフジニルカプセル100mg「トーワ」	セフェム系製剤	
院外採用	セフジニル錠100mg「サワイ」	セフェム系製剤	
院外採用	セフゾンカプセル100mg	セフェム系製剤	
院外採用	セフゾンカプセル50mg	セフェム系製剤	
院外採用	セフゾン細粒小児用10%	セフェム系製剤	
両採用	セフタジジム静注用1g「CHM」	セフェム系抗生物質	
院外採用	ゼフナートクリーム2%	抗真菌剤	
院外採用	ゼフナート外用液2%	抗真菌剤	
両採用	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」	セファマイシン系抗生物質	
両採用	セフメタゾン静注用1g	セファマイシン系抗生物質	
院外採用	ゼベリン点眼液0.1%	アレルギー性結膜炎治療剤	
両採用	ゼボジアカプセル0.92mg	潰瘍性大腸炎治療剤	劇
両採用	ゼボジアカプセルスターターバック	潰瘍性大腸炎治療剤	劇
両採用	ゼボフルラン吸入麻酔液「VTRS」	全身吸入麻酔剤	劇
院外採用	ゼボラステープ20mg	経皮吸収型鎮痛・消炎剤	
院外採用	ゼボラステープ40mg	経皮吸収型鎮痛・消炎剤	
院外採用	ゼボラスパップ40mg	経皮吸収型鎮痛・消炎剤	
両採用	セムブリックス錠40mg	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼインヒビター（ABLミリスチルポケット結合型阻害剤）	劇
院外採用	セラピナ配合顆粒	総合感冒剤	劇
院外採用	セララ錠100mg	選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬	
院外採用	セララ錠25mg	選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬	
院外採用	セララ錠50mg	選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬	
両採用	セルシン注射液10mg	マイナートランクライザー	精3
両採用	セルセプトカプセル250	免疫抑制剤	劇
院外採用	セルタッチテープ70	経皮鎮痛消炎剤	
院外採用	セルタッチパップ140	経皮鎮痛消炎剤	
院外採用	セルタッチパップ70	経皮鎮痛消炎剤	
両採用	セルトラリンOD錠25mg「トーワ」	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	劇
院外採用	セルニルトン錠	前立腺疾患治療剤	
院外採用	セルベックスカプセル50mg	胃炎・胃潰瘍治療剤	
院外採用	セルベックス細粒10%	胃炎・胃潰瘍治療剤	
両採用	ゼルヤンツ錠5mg	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤	劇
両採用	セレコキシブ錠100mg「DSEP」	非ステロイド性消炎・鎮痛剤	劇
院外採用	セレコックス錠100mg	非ステロイド性消炎・鎮痛剤	劇
院外採用	セレコックス錠200mg	非ステロイド性消炎・鎮痛剤	劇
院外採用	セレジストOD錠5mg	脊髄小脳変性症治療剤	
院外採用	セレスタミン配合シロップ	副腎皮質ホルモン・抗ヒスタミン配合剤	
院外採用	セレスタミン配合錠	副腎皮質ホルモン・抗ヒスタミン配合剤	
院外採用	セレニカR錠200mg	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	

院外採用	セレニカR錠400mg	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	
院外採用	セレニカR顆粒40%	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	
両採用	セレネース錠0.75mg	抗精神病剤	劇
両採用	セレネース注5mg	抗精神病剤	劇
院外採用	セレベント50ディスクス	長時間作動型吸入気管支拡張剤	
院外採用	ゼロダ錠300	抗悪性腫瘍剤	劇
院外採用	セロクエル200mg錠	抗精神病剤	劇
院外採用	セロクエル25mg錠	抗精神病剤	劇
院外採用	セロクエル細粒50%	抗精神病剤	劇
院外採用	セロクラール錠10mg	鎮量剤	
院外採用	セロクラール錠20mg	鎮量剤	
院外採用	セロケン錠20mg	高血圧・狭心症・不整脈治療剤	劇
両採用	ゼンタコートカプセル3mg	クローン病治療剤	
両採用	センノシド錠12mg「サワイ」	緩下剤	
両採用	ゾーフィゴ静注	放射性医薬品/抗悪性腫瘍剤	劇
院外採用	ゾーミッグRM錠2.5mg	片頭痛治療剤	劇
両採用	ゾコーバ錠125mg	抗SARS-CoV-2剤	劇
両採用	ゾスパタ錠40mg	抗悪性腫瘍剤/FLT3阻害剤	劇
院外採用	ソセゴン錠25mg	鎮痛剤	劇 精2
両採用	ソセゴン注射液15mg	鎮痛剤	劇 精2
両採用	ソタコール錠40mg	不整脈治療剤	
両採用	ゾテピン錠25mg「ヨシトミ」	統合失調症治療剤	劇
両採用	ソナゾイド注射用16μL	超音波診断用造影剤	
院外採用	ソニアス配合錠HD	2型糖尿病治療剤	劇
院外採用	ソニアス配合錠LD	2型糖尿病治療剤	劇
院外採用	ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」	睡眠障害改善剤	精3
両採用	ゾピラックス眼軟膏3%	ヘルペス性角膜炎化学療法剤	
両採用	ゾピラックス錠200	抗ウイルス化学療法剤	
院外採用	ゾピラックス軟膏5%	抗ヘルペスウイルス外用剤	
院外採用	ゾピラックス顆粒40%	抗ウイルス化学療法剤	
両採用	ソフラチュール貼付剤10cm	化膿性疾患用剤	
院外採用	ゾフルーザ錠20mg	抗インフルエンザウイルス剤	
両採用	ソマチュリン皮下注120mg	持続性ソマトスタチンアナログ徐放性製剤	劇
両採用	ゾメタ点滴静注4mg/100mL	骨吸収抑制剤	劇
両採用	ゾラデックス3.6mgデポ	LH-RHアゴニスト	劇
両採用	ゾラデックスLA10.8mgデポ	LH-RHアゴニスト	劇
院外採用	ソラナックス0.4mg錠	抗不安剤	精3
院外採用	ソランタール錠100mg	鎮痛・抗炎症剤	
両採用	ソリターT2号輸液	脱水補給液	
両採用	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ニプロ」	過活動膀胱治療剤	
両採用	ソリリス点滴静注300mg	抗補体(C5)モノクローナル抗体製剤	劇
両採用	ゾリンザカプセル100mg	抗悪性腫瘍剤/ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤	劇
両採用	ソル・コーテフ静注用250mg	副腎皮質ホルモン剤	
両採用	ソル・コーテフ静注用500mg	副腎皮質ホルモン剤	
両採用	ソル・コーテフ注射用100mg	副腎皮質ホルモン剤	
両採用	ソル・メドロール静注用1000mg	副腎皮質ホルモン剤	
両採用	ソル・メドロール静注用125mg	副腎皮質ホルモン剤	
両採用	ソル・メドロール静注用40mg	副腎皮質ホルモン剤	
両採用	ソル・メドロール静注用500mg	副腎皮質ホルモン剤	
両採用	ソルアセットD輸液	細胞外液補充液	
両採用	ソルアセットF輸液	酢酸リンゲル液	
両採用	ソルデム1輸液	開始液	
両採用	ソルデム1輸液	開始液	
両採用	ソルデム3A輸液	維持液	

両採用	ソルデム3A輸液	維持液	
院外採用	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	持効型溶解インスリンアナログ/ヒトGLP-1アナログ製剤	劇
院外採用	ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーワ」	入眠剤	精3
両採用	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」	入眠剤	精3
院外採用	ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「トーワ」	入眠剤	精3
院外採用	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「アメル」	入眠剤	精3
両採用	ソルラクト輸液	L-乳酸ナトリウムリンゲル液	
両採用	ゾレア皮下注150mgシリンジ	気管支喘息・季節性アレルギー性鼻炎・慢性蕁麻疹治療剤	劇
両採用	ゾレア皮下注75mgシリンジ	気管支喘息・季節性アレルギー性鼻炎・慢性蕁麻疹治療剤	劇
両採用	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「KCC」	骨吸収抑制剤	劇
両採用	ダーブロック錠1mg	HIF-PH阻害薬	劇
両採用	ダーブロック錠2mg	HIF-PH阻害薬	劇
両採用	ダーブロック錠4mg	HIF-PH阻害薬	劇
両採用	ダーブロック錠6mg	HIF-PH阻害薬	劇
院外採用	ダイアート錠30mg	持続型ループ利尿剤	
院外採用	ダイアート錠60mg	持続型ループ利尿剤	
両採用	ダイアップ坐剤10	小児用抗けいれん剤	
両採用	ダイアップ坐剤4	小児用抗けいれん剤	
両採用	ダイアップ坐剤6	小児用抗けいれん剤	
両採用	ダイアニール-NPD-21.5腹膜透析液	腹膜透析液	
両採用	ダイアモックス錠250mg	炭酸脱水酵素抑制剤	
両採用	ダイアモックス注射用500mg	炭酸脱水酵素抑制剤	
両採用	タイケルブ錠250mg	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤	劇
両採用	ダイフェン配合錠	合成抗菌剤	
両採用	ダイフェン配合顆粒	合成抗菌剤	
両採用	ダウノマイシン静注用20mg	抗白血病・抗悪性腫瘍抗生物質製剤	劇
院外採用	タウリン散98%「大正」	肝・循環機能改善剤	
院外採用	タガメット錠200mg	H2受容体拮抗剤	
両採用	ダカルバジン注用100	抗悪性腫瘍剤	劇
両採用	タグリッソ錠40mg	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤	劇
両採用	タグリッソ錠80mg	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤	劇
両採用	タクロリムスカプセル0.5mg「VTRS」	免疫抑制剤	劇
両採用	タクロリムスカプセル1mg「VTRS」	免疫抑制剤	劇
両採用	タケキャブ錠10mg	プロトンポンプ・インヒビター	
両採用	タケキャブ錠20mg	プロトンポンプ・インヒビター	
院外採用	タケプロンOD錠15	プロトンポンプ・インヒビター	
院外採用	タケプロンOD錠30	プロトンポンプ・インヒビター	
院外採用	タケプロンカプセル15	プロトンポンプ・インヒビター	
院外採用	タケプロンカプセル30	プロトンポンプ・インヒビター	
両採用	タコシール組織接着用シート	生物学的組織接着・閉鎖剤	特生
両採用	タコシール組織接着用シート	生物学的組織接着・閉鎖剤	特生
両採用	ダサチニブ錠20mg「トーワ」	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼインヒビター	劇
両採用	ダサチニブ錠50mg「トーワ」	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼインヒビター	劇
院外採用	タシグナカプセル150mg	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼインヒビター	劇
院外採用	タシグナカプセル200mg	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼインヒビター	劇
両採用	タゾピベ配合静注用4.5「明治」	$\beta$ -ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	
両採用	タダラフィル錠5mgZA「サワイ」	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤	
両採用	タチオン注射用200mg	グルタチオン製剤	
両採用	ダトロウェイ点滴静注用100mg	抗悪性腫瘍剤/抗TROP-2抗体トポイソメラーゼI阻害剤複合体	劇

両採用	タナドローパ顆粒 7.5%	ドパミンプロドラッグ	劇
院外採用	タナトリル錠 5	アンジオテンシン変換選択性阻害剤	
両採用	タバリス錠 100mg	血小板破壊抑制薬/脾臓チロシンキナーゼ阻害薬	劇
両採用	タバリス錠 150mg	血小板破壊抑制薬/脾臓チロシンキナーゼ阻害薬	劇
両採用	タフィンラーカプセル 75mg	抗悪性腫瘍剤/BRAF阻害剤	劇
院外採用	ダフクリア錠 200mg	クロストリジウム・ディフィシル感染症治療剤	
院外採用	タブコム配合点眼液	緑内障・高眼圧症治療剤	劇
両採用	ダプトマイシン静注用 350mg 「ニプロ」	環状リポペプチド系抗生物質製剤	
院外採用	タブロスミニ点眼液 0.0015%	緑内障・高眼圧症治療剤	劇
院外採用	タブロス点眼液 0.0015%	緑内障・高眼圧症治療剤	劇
院外採用	タベジール錠 1mg	持続性抗ヒスタミン剤	
院外採用	タベンタ錠 25mg	持続性癌疼痛治療剤	麻劇
院外採用	タミフルカプセル 75	抗インフルエンザウイルス剤	
院外採用	タミフルドライシロップ 3%	抗インフルエンザウイルス剤	
院外採用	タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg 「明治」	前立腺肥大症排尿障害改善剤	
院外採用	タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「サワイ」	前立腺肥大症排尿障害改善剤	
両採用	タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「トーフ」	前立腺肥大症排尿障害改善剤	
院外採用	タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「明治」	前立腺肥大症排尿障害改善剤	
院外採用	タムスロシン塩酸塩カプセル 0.1mg 「サワイ」	前立腺肥大症排尿障害改善剤	
院外採用	タムスロシン塩酸塩カプセル 0.2mg 「サワイ」	前立腺肥大症排尿障害改善剤	
両採用	ダラキューロ配合皮下注	ヒト型抗CD38モノクローナル抗体/ヒアルロン酸分解酵素配合剤	劇
両採用	ダラザレックス点滴静注 100mg	ヒト型抗CD38モノクローナル抗体	劇
両採用	ダラザレックス点滴静注 400mg	ヒト型抗CD38モノクローナル抗体	劇
両採用	ダラシカプセル 150mg	リンコマイシン系抗生物質	
両採用	タリージェOD錠 5mg	神経障害性疼痛治療剤	
院外採用	タリージェ錠 5mg	神経障害性疼痛治療剤	
院外採用	タリオン錠 10mg	選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤	
両採用	タリビッド眼軟膏 0.3%	広範囲抗菌点眼剤	
両採用	タリビッド耳科用液 0.3%	ニューキノロン系抗菌耳科用製剤	
院外採用	タリビッド点眼液 0.3%	広範囲抗菌点眼剤	
院外採用	タルセバ錠 100mg	抗悪性腫瘍剤/上皮増殖因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤	劇
両採用	タルセバ錠 150mg	抗悪性腫瘍剤/上皮増殖因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤	劇
院外採用	タルセバ錠 25mg	抗悪性腫瘍剤/上皮増殖因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤	劇
院外採用	タルチレリンOD錠 5mg 「日医工」	脊髄小脳変性症治療剤	
両採用	ダルテパリンNa静注 5000単位/5mL 「サワイ」	血液凝固阻止剤	
両採用	ダルベポエチン アルファ注 10μg シリンジ 「KK	持続型赤血球造血刺激因子製剤	劇
両採用	ダルベポエチン アルファ注 120μg シリンジ 「KKF」	持続型赤血球造血刺激因子製剤	劇
両採用	ダルベポエチン アルファ注 15μg シリンジ 「KK	持続型赤血球造血刺激因子製剤	劇
両採用	ダルベポエチン アルファ注 20μg シリンジ 「KK	持続型赤血球造血刺激因子製剤	劇
両採用	ダルベポエチン アルファ注 30μg シリンジ 「KK	持続型赤血球造血刺激因子製剤	劇
両採用	ダルベポエチン アルファ注 40μg シリンジ 「KK	持続型赤血球造血刺激因子製剤	劇
両採用	ダルベポエチン アルファ注 5μg シリンジ 「KKF」	持続型赤血球造血刺激因子製剤	劇
両採用	ダルベポエチン アルファ注 60μg シリンジ 「KK	持続型赤血球造血刺激因子製剤	劇
両採用	ダントリウムカプセル 25mg	痙攣性麻痺緩解・悪性症候群治療剤	
両採用	ダントリウム静注用 20mg	悪性高熱症・悪性症候群治療剤	
院外採用	タンニン酸アルブミン 「VTRS」 原末	止瀉剤	
院外採用	タンニン酸アルブミン 「ファイザー」 原末	整腸剤	
院外採用	タンボコール錠 50mg	頻脈性不整脈治療剤	劇

院外採用	チアトンカプセル10mg	キノリジジン系抗ムスカリン剤	
院外採用	チアトンカプセル5mg	キノリジジン系抗ムスカリン剤	
両採用	チアブリド錠25mg「NIG」	チアブリド製剤	
院外採用	チアブリド錠25mg「日医工」	チアブリド製剤	
院外採用	チアブリド錠50mg「日医工」	チアブリド製剤	
両採用	チウラジール錠50mg	抗甲状腺剤	
両採用	チエナム点滴静注用0.5g	カルバベネム系抗生物質	
両採用	チエナム点滴静注用キット0.5g	カルバベネム系抗生物質	
院外採用	チオラ錠100	代謝改善解毒・シスチン尿症治療剤	
両採用	チキジウム臭化物カプセル10mg「トーフ」	キノリジジン系抗ムスカリン剤	
院外採用	チザニジン錠1mg「日医工」	筋緊張緩和剤	
院外採用	チモプトールXE点眼液0.25%	持続性緑内障・高眼圧症治療剤	
院外採用	チモプトール点眼液0.25%	緑内障・高眼圧症治療剤	
院外採用	チモプトール点眼液0.5%	緑内障・高眼圧症治療剤	
両採用	チモロールXE点眼液0.5%「杏林」	持続性緑内障・高眼圧症治療剤	
両採用	チラーゼンS錠100μg	甲状腺ホルモン剤	劇
院外採用	チラーゼンS錠12.5μg	甲状腺ホルモン剤	劇
両採用	チラーゼンS錠25μg	甲状腺ホルモン剤	劇
両採用	チラーゼンS錠50μg	甲状腺ホルモン剤	劇
院外採用	チラーゼンS錠75μg	甲状腺ホルモン剤	劇
両採用	チラーゼンS静注液200μg	甲状腺ホルモン剤	劇
両採用	ツイミーグ錠500mg	糖尿病用剤	
両採用	ツインラインNF配合経腸用液	消化態経腸栄養剤	
院外採用	ツートラム錠100mg	慢性疼痛・がん疼痛持続性鎮痛剤	劇
院外採用	ツートラム錠25mg	慢性疼痛・がん疼痛持続性鎮痛剤	劇
院外採用	ツートラム錠50mg	慢性疼痛・がん疼痛持続性鎮痛剤	劇
院外採用	つくしA・M配合散	健胃・消化剤	
院外採用	ツベルミン錠100mg	結核化学療法剤	
院外採用	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院外採用	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
両採用	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
両採用	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院外採用	ツムラ葛根湯加川きょう辛夷エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院外採用	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院内採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
両採用	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院外採用	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院外採用	ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院外採用	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院外採用	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院外採用	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
両採用	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院外採用	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院外採用	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院外採用	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院外採用	ツムラ参蘇飲エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院外採用	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院外採用	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院外採用	ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院外採用	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院外採用	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
両採用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院外採用	ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院外採用	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	

院外採用	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）	漢方製剤	
両採用	ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）	漢方製剤	
院外採用	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用）	漢方製剤	
両採用	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）	漢方製剤	
両採用	ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用）	漢方製剤	
院外採用	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）	漢方製剤	
院外採用	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）	漢方製剤	
両採用	ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）	漢方製剤	
院外採用	ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）	漢方製剤	
院外採用	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）	漢方製剤	
院外採用	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）	漢方製剤	
両採用	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）	漢方製剤	
院外採用	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）	漢方製剤	
院外採用	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）	漢方製剤	
両採用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）	漢方製剤	
院外採用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	漢方製剤	
院外採用	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）	漢方製剤	
両採用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）	漢方製剤	
両採用	ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）	漢方製剤	
院外採用	ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）	漢方製剤	
院外採用	ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用）	漢方製剤	
院外採用	ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）	漢方製剤	
院外採用	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用）	漢方製剤	
院外採用	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）	漢方製剤	
両採用	ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）	漢方製剤	
院外採用	ツムラ茶桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）	漢方製剤	
両採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）	漢方製剤	
両採用	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）	漢方製剤	
両採用	ツルバダ配合錠	抗ウイルス化学療法剤	劇
院外採用	ティーエスワン配合OD錠T20	代謝拮抗剤	劇
院外採用	ティーエスワン配合OD錠T25	代謝拮抗剤	劇
院外採用	ティーエスワン配合カプセルT20	代謝拮抗剤	劇
院外採用	ティーエスワン配合カプセルT25	代謝拮抗剤	劇
院外採用	ティーエスワン配合顆粒T20	代謝拮抗剤	劇
院外採用	ティーエスワン配合顆粒T25	代謝拮抗剤	劇
院外採用	デオバン錠160mg	選択的AT1受容体ブロッカー	
院外採用	デオバン錠20mg	選択的AT1受容体ブロッカー	
院外採用	デオバン錠40mg	選択的AT1受容体ブロッカー	
院外採用	デオバン錠80mg	選択的AT1受容体ブロッカー	
両採用	テイコプラニン点滴静注用200mg「トーワ」	グリコペプチド系抗生物質製剤	劇
院外採用	ディナゲストOD錠1mg	子宮内膜症・子宮腺筋症に伴う疼痛改善治療剤	
院外採用	ディナゲスト錠0.5mg	月経困難症治療剤	
院外採用	ディレグラ配合錠	アレルギー性疾患治療剤	
院外採用	デエピゴ錠2.5mg	不眠症治療剤	
両採用	デエピゴ錠5mg	不眠症治療剤	
院外採用	テオドール錠100mg	キサンチン系気管支拡張剤	
院外採用	テオドール錠200mg	キサンチン系気管支拡張剤	劇
院外採用	テオドール錠50mg	キサンチン系気管支拡張剤	
両採用	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	キサンチン系気管支拡張剤	劇
両採用	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	キサンチン系気管支拡張剤	
院外採用	テオロング錠100mg	テオフィリン徐放製剤	
院外採用	テオロング錠200mg	テオフィリン徐放製剤	劇
院外採用	テオロング錠50mg	テオフィリン徐放製剤	

院外採用	デカドロンエリキシル0.01%	副腎皮質ホルモン剤	
両採用	デカドロン錠0.5mg	副腎皮質ホルモン剤	
両採用	デカドロン錠4mg	副腎皮質ホルモン剤	
両採用	デキサート注射液1.65mg	副腎皮質ホルモン製剤	
両採用	デキサート注射液6.6mg	副腎皮質ホルモン製剤	
両採用	デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」	副腎皮質ホルモン剤	
両採用	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	口腔粘膜疾患治療剤	
両採用	デクスメトミジン静注液200 $\mu$ g/50mLシリンジ「ニプロ」	$\alpha$ 2作動性鎮静剤	劇
院外採用	テクスメテンユニバーサルクリーム0.1%	外用合成副腎皮質ホルモン剤	劇
両採用	テクネMAG3注射液	腎・尿路疾患診断薬	
両採用	テクネMAG3注射液	腎・尿路疾患診断薬	
両採用	テクネMDPキット	骨疾患・脳腫瘍・脳血管障害診断薬	
両採用	テクネMDP注射液	骨疾患・脳腫瘍・脳血管障害診断薬	
両採用	テクネシンチ注-10M	脳・甲状腺・唾液腺・異所性胃粘膜疾患診断薬	
両採用	テクネシンチ注-20M	脳・甲状腺・唾液腺及び異所性胃粘膜疾患診断薬	
両採用	テクネゾール	脳・甲状腺・唾液腺及び異所性胃粘膜疾患診断薬	
両採用	テグレート細粒50%	向精神作用性てんかん・躁状態治療剤	
院外採用	テグレート錠100mg	向精神作用性てんかん・躁状態治療剤	
院外採用	テグレート錠200mg	向精神作用性てんかん・躁状態治療剤	
院外採用	デザレックス錠5mg	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤	
両採用	デンコビ配合錠HT	抗ウイルス化学療法剤	劇
院外採用	テシプール錠1mg	四環系抗うつ剤	劇
院外採用	デジレル錠50	抗うつ剤	劇
両採用	テストノンデポー筋注用250mg	持続性男性ホルモン剤	
両採用	デスフェラル注射液500mg	鉄排泄剤	劇
院外採用	デスマプレシン・スプレー10協和	夜尿症用剤	劇
両採用	デスマプレシン点鼻スプレー2.5 $\mu$ g「フェリング」	中枢性尿崩症用剤	劇
両採用	テゼスパイア皮下注210mgシリンジ	ヒト抗TSLPモノクローナル抗体	劇
両採用	テセントリク点滴静注1200mg	抗悪性腫瘍剤/抗PD-L1ヒト化モノクローナル抗体	劇
両採用	テセントリク点滴静注840mg	抗悪性腫瘍剤/抗PD-L1ヒト化モノクローナル抗体	劇
両採用	テタノプリンIH静注250単位	血漿分画製剤	特生
院外採用	デタントール0.01%点眼液	緑内障・高眼圧症治療剤	
両採用	デトキソール静注液2g	解毒剤	
院外採用	デトルシールカプセル4mg	過活動膀胱治療剤	
院外採用	テナキシル錠1mg	持続型非チアジド系降圧剤	
両採用	テネリアOD錠20mg	2型糖尿病治療剤	
院外採用	テネリア錠20mg	2型糖尿病治療剤	
院外採用	テネリア錠40mg	2型糖尿病治療剤	
院外採用	テノーミン錠25	心臓選択性 $\beta$ 遮断剤	
院外採用	テノーミン錠50	心臓選択性 $\beta$ 遮断剤	
両採用	テノゼット錠300mg	抗ウイルス化学療法剤	劇
両採用	デノタスチュアブル配合錠	カルシウム/天然型ビタミンD3/マグネシウム配合剤	
院外採用	デバケンR錠100mg	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	
両採用	デバケンR錠200mg	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	
院外採用	デバケンシロップ5%	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	
院外採用	デバケン細粒40%	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	
院外採用	デバケン錠100mg	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	
院外採用	デバケン錠200mg	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	
院外採用	デバス細粒1%	精神安定剤	精3
院外採用	デバス錠0.5mg	精神安定剤	精3
院外採用	デバス錠1mg	精神安定剤	精3
両採用	テビケイ錠50mg	HIVインテグラーゼ阻害剤	劇
両採用	デファイテリオ静注200mg	肝類洞閉塞症候群治療剤	

両採用	デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	鉄キレート剤	劇
院外採用	デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	鉄キレート剤	劇
両採用	テブミトコ錠250mg	抗悪性腫瘍剤/チロシinkinase阻害薬	劇
両採用	テブレノンカプセル50mg「トーワ」	胃炎・胃潰瘍治療剤	
両採用	テブレノン細粒10%「トーワ」	胃炎・胃潰瘍治療剤	
院外採用	デベルザ錠20mg	2型糖尿病治療剤	
両採用	デポ・メドロール水懸注20mg	持続性合成副腎皮質ホルモン剤	
院外採用	デュオトラバ配合点眼液	緑内障・高眼圧症治療剤	
両採用	デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」	前立腺肥大症治療薬	劇
両採用	デュピクセント皮下注300mgペン	ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体	劇
両採用	デュファストン錠5mg	レトロ・プロゲステロン製剤	
両採用	デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤	劇
院外採用	デュロテップMTパッチ12.6mg	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	麻劇
院外採用	デュロテップMTパッチ16.8mg	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	麻劇
院外採用	デュロテップMTパッチ2.1mg	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	麻劇
院外採用	デュロテップMTパッチ4.2mg	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	麻劇
院外採用	デュロテップMTパッチ8.4mg	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	麻劇
院外採用	テラ・コートリル軟膏	抗生物質・副腎皮質ホルモン配合剤	
院外採用	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	骨粗鬆症治療剤	
両採用	テリボン皮下注用56.5μg	骨粗鬆症治療剤	
両採用	テリルジー100エリプタ30吸入用	喘息・COPD治療配合剤	
両採用	テリルジー200エリプタ30吸入用	喘息治療配合剤	
両採用	テルネリン錠1mg	筋緊張緩和剤	
両採用	テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	アリルアミン系抗真菌剤	
両採用	テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー	
院外採用	デルモベートスカルプブローション0.05%	外用合成副腎皮質ホルモン剤	劇
両採用	デルモベート軟膏0.05%	外用合成副腎皮質ホルモン剤	劇
両採用	テルモ生食	生理食塩液	
両採用	トアラセット配合錠「DSEP」	慢性疼痛/抜歯後疼痛治療剤	劇
両採用	トリーセル点滴静注液25mg	抗悪性腫瘍剤/mTOR阻害剤	劇
両採用	ドキサゾン錠2mg「サワイ」	血圧降下剤	
院外採用	ドキサゾン錠2mg「タナベ」	血圧降下剤	
両採用	ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	抗悪性腫瘍剤	劇
両採用	ドキシソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	抗悪性腫瘍剤	劇
院外採用	ドグマチールカプセル50mg	精神安定・抗潰瘍剤	
院外採用	ドグマチール錠50mg	精神安定・抗潰瘍剤	
両採用	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」	微小循環系賦活剤	
両採用	トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」	ニューキノロン系経口抗菌製剤	
院外採用	トスフロ点眼液0.3%	広範囲抗菌点眼剤	
両採用	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	タキソイド系抗悪性腫瘍剤	
両採用	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	タキソイド系抗悪性腫瘍剤	
両採用	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤	劇
両採用	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤	劇
両採用	ドパコール配合錠L100	パーキンソンニズム治療剤	
両採用	ドバトン静注25mg	パーキンソンニズム治療剤	
両採用	トビエース錠4mg	過活動膀胱・神経因性膀胱治療剤	
院外採用	トピナ細粒10%	抗てんかん剤	
院外採用	トピナ錠100mg	抗てんかん剤	
院外採用	トピナ錠25mg	抗てんかん剤	
院外採用	トピナ錠50mg	抗てんかん剤	
院外採用	トフィソパム錠50mg「日医工」	自律神経調整剤	
両採用	トプシムクリーム0.05%	外用合成副腎皮質ホルモン剤	劇
両採用	ドブスOD錠100mg	ノルアドレナリン作動性神経機能改善剤	

両採用	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	急性循環不全改善剤, 心臓疾患診断補助剤	劇
両採用	ドブタミン点滴静注液100mg「VTRS」	急性循環不全改善剤, 心臓疾患診断補助剤	劇
両採用	トブラシン注60mg	アミノグリコシド系抗生物質	劇
院外採用	トフラニール錠10mg	うつ病・うつ状態治療剤	
両採用	ドプラム注射液400mg	呼吸促進剤	劇
院外採用	ドボベツ軟膏	尋常性乾癬治療剤	劇
院外採用	ドラール錠15	睡眠障害改善剤	
院外採用	トライコア錠53.3mg	高脂血症治療剤	
院外採用	トライコア錠80mg	高脂血症治療剤	
両採用	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」	抗悪性腫瘍剤/抗HER2ヒト化モノクローナル抗体	
両採用	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」	抗悪性腫瘍剤/抗HER2ヒト化モノクローナル抗体	
両採用	トラセミドOD錠4mg「TE」	ループ利尿剤	
院外採用	トラゼンタ錠5mg	2型糖尿病治療剤	
両採用	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	抗うつ剤	劇
院外採用	トラディアンス配合錠AP	2型糖尿病治療剤	
院外採用	トラディアンス配合錠BP	2型糖尿病治療剤	
院外採用	トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」	抗プラスミン剤	
両採用	トラネキサム酸錠250mg「YD」	抗プラスミン剤	
両採用	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	抗プラスミン剤	
院外採用	トラバタンズ点眼液0.004%	緑内障・高眼圧症治療剤	
両採用	トラベルミン配合錠	鎮暈剤	
院外採用	トラマールOD錠25mg	がん疼痛・慢性疼痛治療剤	劇
両採用	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	がん疼痛・慢性疼痛治療剤	劇
院外採用	トラムセット配合錠	慢性疼痛/抜歯後疼痛治療剤	劇
院外採用	トランサミンカプセル250mg	抗プラスミン剤	
院外採用	トランサミンシロップ5%	抗プラスミン剤	
両採用	トランサミン散50%	抗プラスミン剤	
院外採用	トランサミン錠250mg	抗プラスミン剤	
院外採用	トランサミン錠500mg	抗プラスミン剤	
院外採用	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	睡眠導入剤	精3
両採用	トリクロロルシロップ10%	催眠剤	劇
両採用	トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」	降圧利尿剤	
院外採用	トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」	チアジド系降圧利尿剤	
両採用	トリセノックス点滴静注12mg	再発・難治性急性前骨髄球性白血病治療剤	
院外採用	トリノシン腸溶錠20mg	アデノシン三リン酸製剤	
院外採用	トリノシン顆粒10%	アデノシン三リン酸製剤	
両採用	トリプタノール錠10	三環系抗うつ剤	
院外採用	トリプタノール錠25	三環系抗うつ剤	
両採用	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」	消化管運動調律剤	
院外採用	トルソプト点眼液0.5%	点眼用炭酸脱水酵素阻害剤	
両採用	トルソプト点眼液1%	点眼用炭酸脱水酵素阻害剤	
院外採用	トルツ皮下注80mgオートインジェクター	ヒト化抗ヒトIL-17Aモノクローナル抗体製剤	劇
院外採用	ドルナー錠20μg	PGI2誘導体製剤	劇
両採用	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	持続性GLP-1受容体作動薬	劇
両採用	トレランG液75g	糖忍容力試験用糖液	
両採用	トレシーバ注フレックスタッチ	持効型溶解インスリンアナログ製剤	劇
院外採用	トレドミン錠15mg	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤	劇
院外採用	トレドミン錠25mg	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤	劇
院外採用	ドレニゾンテープ4μg/cm2	皮膚疾患用密封療法剤	
両採用	トレプロスト吸入液1.74mg	PGI2誘導体製剤	劇
両採用	トレムフィア皮下注100mgシリンジ	ヒト型抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤	劇
両採用	トレリーフOD錠25mg	パーキンソン病・レビー小体型認知症に伴うパーキンソンニズム治療薬(レボドパ賦活剤)	劇

院外採用	ドロエチ配合錠「あすか」	月経困難症治療剤	
両採用	トロデルピ点滴静注用200mg	抗悪性腫瘍剤/抗TROP-2抗体トポイソメラーゼI阻害剤複合体	劇
両採用	ドロレブタン注射液25mg	麻酔用神経遮断剤	劇
両採用	トロンピン液モチダソフトボトル5千	止血剤	
両採用	ドンペリドン錠10mg「トーワ」	消化管運動改善剤	
両採用	ナイキサン錠100mg	鎮痛・抗炎症剤	
院外採用	ナウゼリンOD錠10	消化管運動改善剤	
両採用	ナウゼリンドライシロップ1%	消化管運動改善剤	
両採用	ナウゼリン坐剤10	消化管運動改善剤	
両採用	ナウゼリン坐剤30	消化管運動改善剤	
両採用	ナウゼリン坐剤60	消化管運動改善剤	
院外採用	ナウゼリン錠10	消化管運動改善剤	
院外採用	ナウゼリン錠5	消化管運動改善剤	
両採用	ナゼアOD錠0.1mg	5-HT3受容体拮抗型制吐剤	劇
院外採用	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤	
院外採用	ナトリックス錠1	持続型非チアジド系降圧剤	
院外採用	ナトリックス錠2	持続型非チアジド系降圧剤	
院外採用	ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター	一本鎖ヒト化抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤	劇
両採用	ナノゾラ皮下注30mgシリンジ	一本鎖ヒト化抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤	劇
院外採用	ナバゲルンローション3%	経皮吸収型鎮痛消炎剤	
院外採用	ナバゲルン軟膏3%	経皮吸収型鎮痛消炎剤	
両採用	ナファモスタット注射用50mg「SW」	蛋白分解酵素阻害剤	劇
院外採用	ナフトジール錠2	高血圧治療剤	劇
院外採用	ナポールSRカプセル37.5	持続性鎮痛・抗炎症剤	劇
院外採用	ナポールテープ15mg	経皮鎮痛消炎剤	
両採用	ナルサス錠12mg	持続性癌疼痛治療剤	麻劇
両採用	ナルサス錠24mg	持続性癌疼痛治療剤	麻劇
両採用	ナルサス錠2mg	持続性癌疼痛治療剤	麻劇
両採用	ナルサス錠6mg	持続性癌疼痛治療剤	麻劇
両採用	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	そう痒症改善剤	劇
両採用	ナルベイン注20mg	癌疼痛治療用注射剤	麻劇
両採用	ナルベイン注2mg	癌疼痛治療用注射剤	麻劇
両採用	ナルラピド錠1mg	癌疼痛治療剤	麻劇
院外採用	ナルラピド錠2mg	癌疼痛治療剤	麻劇
両採用	ナルラピド錠4mg	癌疼痛治療剤	麻劇
両採用	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	麻薬拮抗剤	劇
両採用	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	Ca拮抗剤	劇
両採用	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	Ca拮抗剤	劇
両採用	ニコチネルTTS10	禁煙補助剤	
両採用	ニコチネルTTS20	禁煙補助剤	
両採用	ニコチネルTTS30	禁煙補助剤	
院外採用	ニコランジル5mg錠	狭心症治療剤	
両採用	ニコランジル錠5mg「サワイ」	狭心症治療剤	
両採用	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	不安定狭心症・急性心不全治療剤	
両採用	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	脳循環・代謝改善剤	
院外採用	ニゾラルクリーム2%	抗真菌剤	
院外採用	ニゾラルローション2%	抗真菌剤	
両採用	ニトプロ持続静注液6mg	血圧降下剤	
院外採用	ニトラゼパム錠5mg「テバ」	睡眠誘導・抗痙攣剤	
両採用	ニトラゼパム錠5mg「トーワ」	睡眠誘導・抗痙攣剤	精3
院外採用	ニトロールRカプセル20mg	長時間作用型硝酸イソソルビド製剤	
両採用	ニトロールスプレー1.25mg	狭心症発作寛解用口腔内スプレー剤	
両採用	ニトロール錠5mg	虚血性心疾患治療剤	

両採用	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	血圧降下剤/血管拡張剤	劇
両採用	ニトロダームTTS25mg	経皮吸収型狭心症治療剤	劇
両採用	ニトロペン舌下錠0.3mg	狭心症用舌下錠	劇
院外採用	ニバジール錠2mg	高血圧治療剤	劇
院外採用	ニバジール錠4mg	高血圧治療剤	劇
両採用	ニフェジピンCR錠20mg「NP」	持続性Ca拮抗剤/高血圧・狭心症治療剤	劇
院外採用	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	持続性Ca拮抗剤/高血圧・狭心症治療剤	劇
院外採用	ニフェジピンCR錠40mg「NP」	持続性Ca拮抗剤/高血圧・狭心症治療剤	劇
院外採用	ニフェジピンL錠10mg「日医工」	持続性Ca拮抗剤	劇
院外採用	ニフェジピンL錠20mg「日医工」	持続性Ca拮抗剤	劇
院外採用	ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	Ca拮抗剤	劇
両採用	ニフラン点眼液0.1%	非ステロイド性抗炎症点眼剤	
両採用	ニフレック配合内用剤	経口腸管洗浄剤	
院外採用	ニボラジン錠3mg	持続性抗ヒスタミン剤	
両採用	ニュープロパッチ13.5mg	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤	劇
両採用	ニュープロパッチ18mg	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤	劇
院外採用	ニュープロパッチ2.25mg	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤/レストレスレッグス症候群治療剤	劇
両採用	ニュープロパッチ4.5mg	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤/レストレスレッグス症候群治療剤	劇
院外採用	ニュープロパッチ9mg	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤	劇
両採用	ニューモバックスNPシリンジ	細菌ワクチン類	劇
院外採用	ニューレプチル錠10mg	精神神経用剤	
院外採用	ニューロタン錠100mg	A-IIアンタゴニスト	
院外採用	ニューロタン錠25mg	A-IIアンタゴニスト	
院外採用	ニューロタン錠50mg	A-IIアンタゴニスト	
両採用	ニューロライト注射液第一	局所脳血流診断薬	
院外採用	ニューベクオ錠300mg	前立腺癌治療剤	劇
院外採用	ニンラーロカプセル2.3mg	抗悪性腫瘍剤/プロテアソーム阻害剤	
院外採用	ニンラーロカプセル3mg	抗悪性腫瘍剤/プロテアソーム阻害剤	
両採用	ニンラーロカプセル4mg	抗悪性腫瘍剤/プロテアソーム阻害剤	
両採用	ヌーカラ皮下注100mgペン	ヒト化抗IL-5モノクローナル抗体	劇
両採用	ネオラル10mgカプセル	免疫抑制剤	劇
両採用	ネオラル25mgカプセル	免疫抑制剤	劇
両採用	ネオラル50mgカプセル	免疫抑制剤	劇
両採用	ネオラル内用液10%	免疫抑制剤	劇
院外採用	ネオキシテープ73.5mg	経皮吸収型過活動膀胱治療剤	
両採用	ネオシネジンコーワ注1mg	血管収縮・血圧上昇剤	劇
両採用	ネオステリングリーンうがい液0.2%	口腔洗浄・含嗽剤	
院外採用	ネオドパストン配合錠L100	パーキンソンニズム治療剤	
両採用	ネオファーゲン静注20mL	抗アレルギー・肝臓疾患用剤	
両採用	ネオフィリン注PL250mg	強心・喘息治療剤	
院外採用	ネオメドロールEE軟膏	眼科・耳鼻科疾患治療剤	
院外採用	ネキシウムカプセル10mg	プロトンポンプ・インヒビター	
院外採用	ネキシウムカプセル20mg	プロトンポンプ・インヒビター	
両採用	ネクサバル錠200mg	抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤	劇
院外採用	ネシーナ錠12.5mg	2型糖尿病治療剤	
院外採用	ネシーナ錠25mg	2型糖尿病治療剤	
院外採用	ネシーナ錠6.25mg	2型糖尿病治療剤	
両採用	ネスプ注射液120μgプラシリンジ	持続型赤血球造血刺激因子製剤	劇
院外採用	ネリザ坐剤	痔疾用剤	劇
院外採用	ネリザ軟膏	痔疾用剤	劇
院外採用	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	外用合成副腎皮質ホルモン剤	劇
院外採用	ネリゾナ軟膏0.1%	外用合成副腎皮質ホルモン剤	劇

院外採用	ネルボン錠 10mg	睡眠誘導・抗痙攣剤	
院外採用	ネルボン錠 5mg	睡眠誘導・抗痙攣剤	
両採用	ノイアート静注用 1500単位	血液凝固阻止剤	特生
院外採用	ノイエルカプセル 200mg	粘膜防御性胃炎・胃潰瘍治療剤	
院外採用	ノイキノン錠 10mg	代謝性強心剤	
両採用	ノイトロジン注 100μg	遺伝子組換えヒトG-CSF製剤	
両採用	ノイロトロピン錠 4単位	下行性疼痛抑制系賦活型疼痛治療剤	
両採用	ノイロトロピン注射液 3, 6単位	疼痛性・アレルギー性疾患治療剤	
両採用	ノイロビタン配合錠	VB1・VB2・VB6・VB12配合剤	
両採用	ノウリアスト錠 20mg	アデノシンA2A受容体拮抗薬	
両採用	ノーピア錠 100mg	抗ウイルス化学療法剤	劇
両採用	ノクサフィル錠 100mg	深在性真菌症治療剤	劇
両採用	ノクサフィル点滴静注 300mg	深在性真菌症治療剤	劇
両採用	ノバミン錠 5mg	精神神経剤	
両採用	ノバントロン注 10mg	アントラキノン系抗悪性腫瘍剤	
両採用	ノバントロン注 20mg	アントラキノン系抗悪性腫瘍剤	
院外採用	ノベルジン錠 25mg	ウイルソン病・低亜鉛血症治療剤	劇
両採用	ノボセブンH1静注用 5mg シリンジ	遺伝子組換え活性化型血液凝固第VII因子製剤	
院外採用	ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン	二相性プロタミン結晶性インスリンアナログ製剤	劇
院外採用	ノボラピッド注 フレックスタッチ	超速効型インスリンアナログ製剤	劇
両採用	ノボラピッド注 フレックスペン	超速効型インスリンアナログ製剤	劇
院外採用	ノボリン30R注フレックスペン	インスリン製剤	劇
院外採用	ノボリンN注フレックスペン	インスリン製剤	劇
院外採用	ノボリンR注フレックスペン	インスリン製剤	劇
院外採用	ノリトレン錠 10mg	情動調整剤	劇
両採用	ノルアドリナリン注 1mg	血圧上昇剤	劇
院外採用	ノルスパンテープ 10mg	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	劇 精2
院外採用	ノルバスクOD錠 10mg	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤	劇
院外採用	ノルバスクOD錠 2, 5mg	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤	劇
院外採用	ノルバスクOD錠 5mg	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤	劇
院外採用	ノルバスク錠 2, 5mg	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤	劇
院外採用	ノルバスク錠 5mg	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤	劇
院外採用	ノルバデックス錠 10mg	抗乳癌剤	
両採用	ノルバデックス錠 20mg	抗乳癌剤	
両採用	パーサビブ静注透析用シリンジ 2, 5mg	カルシウム受容体作動薬	劇
両採用	パーサビブ静注透析用シリンジ 5mg	カルシウム受容体作動薬	劇
両採用	パーゼタ点滴静注 420mg/14mL	抗悪性腫瘍剤/抗HER2ヒト化モノクローナル抗体	劇
両採用	ハーセプチン注射用 150	抗悪性腫瘍剤/抗HER2ヒト化モノクローナル抗体	
両採用	ハーセプチン注射用 60	抗悪性腫瘍剤/抗HER2ヒト化モノクローナル抗体	
両採用	パーヒューザミン注	局所脳血流診断薬	
両採用	ハーポニー配合錠	抗ウイルス剤	
院外採用	パーロデル錠 2, 5mg	持続性ドパミン作動剤	劇
両採用	バイアスピリン錠 100mg	抗血小板剤	
両採用	ハイイータン錠 50mg	抗悪性腫瘍剤/ME T阻害剤	劇
院外採用	バイエッタ皮下注 10μgペン 300	2型糖尿病治療剤	劇
両採用	ハイカムチン注射用 1, 1mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両採用	ハイカリックRF輸液	高カロリー輸液用基本液	
院外採用	ハイジール消毒用液 10%	殺菌消毒剤	
院外採用	ハイシー顆粒 25%	ビタミンC製剤	
両採用	ハイドレアカプセル 500mg	抗悪性腫瘍剤	劇
院外採用	ハイペン錠 100mg	非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤	劇
院外採用	ハイペン錠 200mg	非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤	劇
両採用	ハイポエタノール液 2%「ケンエー」	外用用殺菌消毒剤	
院外採用	ハイボン細粒 20%	高コレステロール血症改善ビタミン剤	

院外採用	ハイボン錠 20mg	高コレステロール血症改善ビタミン剤	
院外採用	バキシル錠 10mg	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	劇
院外採用	バキシル錠 5mg	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	劇
院外採用	パキロビッドパック 300	抗ウイルス剤	劇 特生
院外採用	パキロビッドパック 600	抗ウイルス剤	劇 特生
院外採用	バクスマー一点鼻粉末剤 3mg	低血糖時救急治療剤	劇
院外採用	バクタ配合錠	合成抗菌剤	
院外採用	バクタ配合顆粒	合成抗菌剤	
両採用	バクトラミン注	カリニ肺炎治療剤	
両採用	バクトロバン鼻腔用軟膏 2%	鼻腔内MRSA除菌剤	
両採用	バクニューバンス水性懸濁注シリンジ		劇
両採用	パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」	抗悪性腫瘍剤	
両採用	パクリタキセル注 30mg/5mL「NK」	抗悪性腫瘍剤	
両採用	パクリタキセル点滴静注液 100mg/16.7mL「ホスピーラ」	抗悪性腫瘍剤	
両採用	パクリタキセル点滴静注液 30mg/5mL「ホスピーラ」	抗悪性腫瘍剤	
両採用	はしか風しん混合生ワクチン「第一三共」		劇
両採用	パシル点滴静注液 500mg	ニューキノロン系抗菌剤	
院外採用	バソメット錠 0.5mg	持続性α1遮断剤	
院外採用	パタノール点眼液 0.1%	抗アレルギー点眼剤	
両採用	ハッカ油「ケンエー」	矯味・矯臭剤	
両採用	ハッカ油「ケンエー」	矯味・矯臭剤	
院外採用	バップフォー錠 10	尿失禁・頻尿・過活動膀胱治療剤	
院外採用	バップフォー錠 20	尿失禁・頻尿・過活動膀胱治療剤	
両採用	バドセブ点滴静注用 30mg	抗悪性腫瘍剤/抗Nectin-4抗体微小管阻害薬複合体	劇
院外採用	パナルジン錠 100mg	抗血小板剤	
院外採用	バナンドライシロップ 5%	セフェム系抗生物質	
院外採用	バナン錠 100mg	セフェム系抗生物質	
両採用	パニマイシン注射液 100mg	アミノグリコシド系抗生物質	劇
両採用	パパベリン塩酸塩注 40mg「日医工」	血管拡張・鎮痙剤	
院外採用	パファリン配合錠 A81	抗血小板剤	
両採用	ハプトグロビン静注 2000単位「JB」	血漿分画製剤	特生
両採用	バベンチオ点滴静注 200mg	抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗ヒトPD-L1モノクローナル抗体	劇
両採用	パム静注 500mg	有機リン剤中毒解毒剤	
院外採用	バラクルード錠 0.5mg	抗ウイルス化学療法剤	劇
両採用	バラシクロビル錠 500mg「トーワ」	抗ウイルス化学療法剤	
両採用	バラマイシン軟膏	化膿性皮膚疾患用剤	
両採用	バリエース発泡顆粒	X線診断二重造影用発泡剤	
院外採用	バリエット錠 10mg	プロトンポンプ阻害剤	
院外採用	バリエット錠 20mg	プロトンポンプ阻害剤	
両採用	バリキサ錠 450mg	抗サイトメガロウイルス化学療法剤	
両採用	バリトゲンHD	消化管X線造影剤	
院外採用	バルサルタンOD錠 40mg「トーワ」	選択的AT1受容体ブロッカー	
両採用	バルサルタンOD錠 80mg「トーワ」	選択的AT1受容体ブロッカー	
院外採用	バルサルタン錠 80mg「サンド」	選択的AT1受容体ブロッカー	
院外採用	ハルシオン 0.125mg錠	睡眠導入剤	精3
両採用	ハルシオン 0.25mg錠	睡眠導入剤	精3
院外採用	バルトレックス錠 500	抗ウイルス化学療法剤	
院外採用	バルトレックス顆粒 50%	抗ウイルス化学療法剤	
院外採用	ハルナールD錠 0.1mg	前立腺肥大症排尿障害改善剤	
院外採用	ハルナールD錠 0.2mg	前立腺肥大症排尿障害改善剤	

両採用	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	
両採用	バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	
院外採用	パルミコート100μgタービュヘイラー112吸入	ドライパウダー吸入式ステロイド剤	
院外採用	パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入	ドライパウダー吸入式ステロイド剤	
両採用	パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入	ドライパウダー吸入式ステロイド剤	
両採用	パルミコート吸入液0.25mg	吸入ステロイド喘息治療剤	
両採用	パルミコート吸入液0.5mg	吸入ステロイド喘息治療剤	
両採用	パルモディアXR錠0.2mg	高脂血症治療剤	
院外採用	パルモディアXR錠0.4mg	高脂血症治療剤	
院外採用	パルモディア錠0.1mg	高脂血症治療剤	
両採用	ハルロピテブ24mg	経皮吸収型ドパミン作動性パーキンソン病治療剤	劇
両採用	ハルロピテブ32mg	経皮吸収型ドパミン作動性パーキンソン病治療剤	劇
両採用	バレイショデンブ「ケンエー」	賦形剤	
両採用	バレプラス輸液	アミノ酸・水溶性ビタミン加総合電解質液	
両採用	バレプラス輸液	アミノ酸・水溶性ビタミン加総合電解質液	
両採用	パロキセチン錠10mg「サワイ」	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	劇
両採用	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	5-HT3受容体拮抗型制吐剤	劇
院外採用	ハロペリドール錠0.75mg「アメル」	抗精神病剤	劇
両採用	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	抗精神病剤	劇
院外採用	パンクレアチン「VTRS」原末	消化酵素製剤	
院外採用	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」	グリコペプチド系抗生物質	
両採用	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	グリコペプチド系抗生物質	
両採用	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	グリコペプチド系抗生物質	
両採用	パンテチン散20%「NIG」	パンテチン製剤	
両採用	パンテチン散20%「テバ」	パンテチン製剤	
院外採用	パンテチン錠100mg「YD」	パンテチン製剤	
院外採用	パンドルローション0.1%	外用副腎皮質ホルモン剤	
両採用	パントール注射液500mg	パンテノール製剤	
院外採用	パントシン散20%	パンテチン製剤	
両採用	ハンブ注射用1000	α型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチド製剤	劇
院外採用	ビ・シフロール錠0.125mg	ドパミン作動性パーキンソン病・レストレスレッグス症候群治療剤	劇
院外採用	ビ・シフロール錠0.5mg	ドパミン作動性パーキンソン病・レストレスレッグス症候群治療剤	劇
両採用	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」	関節機能改善剤	
両採用	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「ニッテン」	角結膜上皮障害治療剤	
両採用	ヒアレインミニ点眼液0.1%	角結膜上皮障害治療用点眼剤	
院外採用	ヒアレインミニ点眼液0.3%	角結膜上皮障害治療用点眼剤	
院外採用	ヒアレイン点眼液0.1%	角結膜上皮障害治療用点眼剤	
院外採用	ヒアレイン点眼液0.3%	角結膜上皮障害治療用点眼剤	
院外採用	ビーソフテンクリーム0.3%	血行促進・皮膚保湿剤	
院外採用	ビーマス配合錠	緩下剤	
両採用	ビーリンサイト点滴静注用35μg	抗悪性腫瘍剤/二重特異性抗体製剤	劇
両採用	ピオグリタゾンOD錠15mg「日医工」	インスリン抵抗性改善剤-2型糖尿病治療剤-	
院外採用	ピオグリタゾン錠30mg「VTRS」	インスリン抵抗性改善剤-2型糖尿病治療剤-	
院外採用	ピオフィェルミンR散	耐性乳酸菌整腸剤	
院外採用	ピオフィェルミンR錠	耐性乳酸菌整腸剤	
院外採用	ピオフィェルミン錠剤	ピフィズ菌整腸剤	
両採用	ピオフィェルミン配合散	乳酸菌整腸剤	
両採用	ピカルタミド錠80mg「トーワ」	前立腺癌治療剤	劇
院外採用	ピカルタミド錠80mg「明治」	前立腺癌治療剤	劇
両採用	ピキセオス配合静注用	抗悪性腫瘍剤	劇
両採用	ピクシリン注射用0.5g	ペニシリン系抗生物質	

両採用	ビクシリン注射用1g	ペニシリン系抗生物質	
院外採用	ビクトルビ配合錠	抗ウイルス化学療法剤	劇
院外採用	ビクトーザ皮下注18mg	ヒトGLP-1アナログ製剤	劇
両採用	ピコスルファートNa内用液0.75%「トーフ」	滴剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤	
院外採用	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」	緩下剤	
両採用	ビシバニール注射用1KE	抗悪性腫瘍・リンパ管腫治療剤	劇
両採用	ビシバニール注射用5KE	抗悪性腫瘍・リンパ管腫治療剤	劇
両採用	ヒスロンH錠200mg	抗悪性腫瘍経口黄体ホルモン製剤	
院外採用	ビソノテープ2mg	経皮吸収型・β1遮断剤	
両採用	ビソノテープ4mg	経皮吸収型・β1遮断剤	
両採用	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「DSEP」	選択的β1アンタゴニスト	
院外採用	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーフ」	選択的β1アンタゴニスト	
両採用	ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「DSEP」	選択的β1アンタゴニスト	
院外採用	ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーフ」	選択的β1アンタゴニスト	
院外採用	ビソルボン吸入液0.2%	気道粘液溶解剤	
両採用	ピタシミン注射液500mg	ビタミンC製剤	
院外採用	ピタノイリンカプセル50	複合ビタミンB剤	
院外採用	ピタファントF錠25	ビタミンB1誘導體	
院外採用	ビタミンB6散10%「マルイシ」	ビタミンB6製剤	
両採用	ピタメジン静注用	複合ビタミン剤	
院外採用	ピタメジン配合カプセルB25	複合ビタミンB剤	
院外採用	ピタメジン配合カプセルB50	複合ビタミンB剤	
両採用	ピダラビン軟膏3%「SW」	抗ウイルス剤	
両採用	ピトレシン注射液20	脳下垂体後葉ホルモン剤	
両採用	ピノルビン注射用10mg	抗悪性腫瘍抗生物質製剤	劇
両採用	ピノルビン注射用20mg	抗悪性腫瘍抗生物質製剤	劇
院外採用	ピビアント錠20mg	骨粗鬆症治療剤	
院外採用	ヒビテン・グルコネート液20%	殺菌消毒剤	
両採用	ビブラマイシン錠100mg	TC系抗生物質	
院外採用	ビフロキシ配合錠	リボフラビン・ピリドキシン塩酸塩配合剤	
両採用	ピペラシリンNa注射用2g「サワイ」	合成ペニシリン製剤	
両採用	ピペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」	合成ペニシリン製剤	
院外採用	ヒベルナ散10%	抗ヒスタミン剤	劇
院外採用	ビホナゾールクリーム1%「F」	抗真菌剤	
院外採用	ビムパットドライシロップ10%	抗てんかん剤	劇
院外採用	ビムパット錠100mg	抗てんかん剤	劇
両採用	ビムパット錠50mg	抗てんかん剤	劇
両採用	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	心不全治療薬	
院外採用	ヒューマリン3/7注100単位/mL	抗糖尿病剤	劇
院外採用	ヒューマリン3/7注カート	抗糖尿病剤	劇
両採用	ヒューマリンN注100単位/mL	抗糖尿病剤	劇
両採用	ヒューマリンR注100単位/mL	抗糖尿病剤	劇
院外採用	ヒューマリンR注ミリオペン	抗糖尿病剤	劇
院外採用	ヒューマログミックス25注ミリオペン	抗糖尿病剤	劇
院外採用	ヒューマログ注100単位/mL	抗糖尿病剤	劇
院外採用	ヒューマログ注カート	抗糖尿病剤	劇
院外採用	ヒューマログ注ミリオペン	抗糖尿病剤	劇
院外採用	ヒューマログ注ミリオペンHD	抗糖尿病剤	劇
両採用	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤	劇
院外採用	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤	劇
両採用	ピラノアOD錠20mg	アレルギー性疾患治療剤	
院外採用	ピラノア錠20mg	アレルギー性疾患治療剤	
両採用	ピラフトピカプセル50mg	抗悪性腫瘍剤/BRAF阻害剤	劇

両採用	ビラフトピカプセル75mg	抗悪性腫瘍剤／BRAF阻害剤	劇
両採用	ピラマイド原末	結核化学療法剤	
両採用	ピリスコピン点滴静注50	胆のう・胆管造影剤	
両採用	ピリドキサル錠10mg「イセイ」	補酵素型ビタミンB6製剤	
両採用	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」	不整脈治療剤	劇
院外採用	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	不整脈治療剤	劇
院外採用	ヒルドイドクリーム0.3%	血行促進・皮膚保湿剤	
院外採用	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	血行促進・皮膚保湿剤	
院外採用	ヒルドイドローション0.3%	血行促進・皮膚保湿剤	
院外採用	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	COPD治療配合剤	
両採用	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	COPD治療配合剤	
両採用	ピレスパ錠200mg	抗線維化剤	劇
両採用	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	老人性白内障治療剤	
両採用	ピロイ点滴静注用100mg	抗悪性腫瘍剤／抗CLDN18.2モノクローナル抗体	劇
両採用	ファセンラ皮下注30mgシリンジ	ヒト化抗IL-5受容体αモノクローナル抗体製剤	劇
院外採用	ファモチジンD錠20mg「日医工」	H2受容体拮抗剤	
院外採用	ファモチジンOD錠10mg「YD」	H2受容体拮抗剤	
両採用	ファモチジンOD錠20mg「トーワ」	H2受容体拮抗剤	
院外採用	ファモチジン散10%「トーワ」	H2受容体拮抗剤	
院外採用	ファモチジン錠10「サワイ」	H2受容体拮抗剤	
両採用	ファモチジン静注20mg「日新」	H2受容体拮抗剤	
両採用	ファロムドライシロップ小児用10%	ベネム系抗生物質	
院外採用	ファロム錠150mg	ベネム系抗生物質	
両採用	ファロム錠200mg	ベネム系抗生物質	
両採用	ファンギゾンシロップ100mg/mL	ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質	劇
両採用	ファンギゾン注射用50mg	ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製剤	
院外採用	フィコンバ錠2mg	抗てんかん剤	
両採用	フィニバックス点滴静注用0.5g	カルバベネム系抗生物質製剤	
両採用	ブイフェンド200mg静注用	深在性真菌症治療剤	劇
院外採用	ブイフェンド錠200mg	深在性真菌症治療剤	劇
院外採用	ブイフェンド錠50mg	深在性真菌症治療剤	劇
両採用	フィブラストスプレー500	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	
両採用	フィプロガミンP静注用	血漿分画製剤／乾燥濃縮人血液凝固第XIII因子製剤	特生
両採用	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」	G-CSF製剤	
両採用	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」	G-CSF製剤	
両採用	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	G-CSF製剤	
両採用	プールシンチ注	血行動態・血管性病変診断薬	
両採用	フェアストーン錠40	乳癌治療剤	劇
両採用	フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」	アレルギー性疾患治療剤	
両採用	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「トーワ」	アレルギー性疾患治療剤	
院外採用	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	アレルギー性疾患治療剤	
両採用	フェジン静注40mg	静注用鉄剤	
両採用	フェスゴ配合皮下注IN	抗悪性腫瘍剤／抗HER2ヒト化モノクローナル抗体・ヒアルロン酸分解酵素配合剤	劇
両採用	フェスゴ配合皮下注MA	抗悪性腫瘍剤／抗HER2ヒト化モノクローナル抗体・ヒアルロン酸分解酵素配合剤	劇
両採用	フェソロデックス筋注250mg	抗エストロゲン剤／乳癌治療剤	劇
両採用	フェノバル散10%	催眠・鎮静・抗けいれん剤	劇精3
院外採用	フェノバル錠30mg	催眠・鎮静・抗けいれん剤	劇精3
両採用	フェノバル注射液100mg	鎮静・抗けいれん剤	劇精3
院外採用	フェノバルピタール散10%「ホエイ」	催眠・鎮静・抗てんかん剤	劇精3
両採用	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	高尿酸血症治療剤	
両採用	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	高尿酸血症治療剤	
院外採用	フェブリク錠10mg	高尿酸血症治療剤	

院外採用	フェブリク錠 20mg	高尿酸血症治療剤	
院外採用	フェブリク錠 40mg	高尿酸血症治療剤	
院外採用	フェマラ錠 2.5mg	アロマターゼ阻害剤	劇
院外採用	フェルピナクスチック軟膏 3% 「三笠」	経皮吸収型鎮痛・消炎剤	
院外採用	フェルピナクパップ 70mg 「NP」	経皮鎮痛消炎剤	
両採用	フェルピナクパップ 70mg 「ユートク」	経皮吸収型鎮痛消炎剤	
院外採用	フェルピナクローション 3% 「三笠」	経皮吸収型鎮痛消炎剤	
院外採用	フェルムカプセル 100mg	徐放性鉄剤	
院外採用	フェロ・グラデュメット錠 105mg	徐放型鉄剤	
院外採用	フェロミア錠 50mg	可溶性非イオン型鉄剤	
院外採用	フェロミア顆粒 8.3%	可溶性非イオン型鉄剤	
院外採用	フェンタニル 3日用テープ 12.6mg 「HMT」	経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤	麻劇
院外採用	フェンタニル 3日用テープ 16.8mg 「HMT」	経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤	麻劇
院外採用	フェンタニル 3日用テープ 2.1mg 「HMT」	経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤	麻劇
院外採用	フェンタニル 3日用テープ 4.2mg 「HMT」	経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤	麻劇
院外採用	フェンタニル 3日用テープ 8.4mg 「HMT」	経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤	麻劇
院外採用	フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ 0.5mg 「テイクコク」	経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤	麻劇
両採用	フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ 1mg 「第一三共」	経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤	麻劇
両採用	フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ 2mg 「第一三共」	経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤	麻劇
両採用	フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ 4mg 「第一三共」	経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤	麻劇
両採用	フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ 6mg 「第一三共」	経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤	麻劇
両採用	フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ 8mg 「第一三共」	経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤	麻劇
両採用	フェンタニル注射液 0.1mg 「テルモ」	麻酔用鎮痛剤	麻劇
両採用	フェンタニル注射液 0.5mg 「テルモ」	麻酔用鎮痛剤	麻劇
両採用	フェントステープ 0.5mg	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	麻劇
院外採用	フェントステープ 1mg	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	麻劇
院外採用	フェントステープ 2mg	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	麻劇
院外採用	フェントステープ 4mg	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	麻劇
院外採用	フェントステープ 6mg	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	麻劇
院外採用	フェントステープ 8mg	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	麻劇
院外採用	フオイパン錠 100mg	蛋白分解酵素阻害剤	
院外採用	フォサマック錠 35mg	骨粗鬆症治療剤	劇
両採用	フォシーガ錠 10mg	選択的 SGLT2 阻害剤	
院外採用	フォシーガ錠 5mg	選択的 SGLT2 阻害剤	
両採用	フォゼベル錠 10mg	高リン血症治療剤	
院外採用	フォゼベル錠 20mg	高リン血症治療剤	
院外採用	フォゼベル錠 30mg	高リン血症治療剤	
両採用	フォゼベル錠 5mg	高リン血症治療剤	
両採用	フォリアミン錠	葉酸製剤	
両採用	フォルテオ皮下注キット 600μg	骨粗鬆症治療剤	
両採用	ブコラム口腔用液 2.5mg	抗けいれん剤	
院外採用	フシジンレオ軟膏 2%	抗生物質製剤	
院外採用	ブシ末 (調剤用) 「ツムラ」	生薬製剤	劇
院外採用	フスコデ配合シロップ	鎮咳剤	
院外採用	フスコデ配合錠	鎮咳剤	
両採用	ブスコパン錠 10mg	鎮痙剤	
両採用	ブスコパン注 20mg	鎮痙剤	劇
院外採用	フスタゾール糖衣錠 10mg	鎮咳剤	

両採用	ブスルフェクス点滴静注用60mg	造血幹細胞移植前治療薬	劇
院外採用	ブドウ糖	糖類剤	
両採用	ブドウ糖「フソー」	糖類剤	
院外採用	プラケニル錠200mg	免疫調整剤	
院外採用	プラザキサカプセル110mg	直接トロンピン阻害剤	
院外採用	プラザキサカプセル75mg	直接トロンピン阻害剤	
両採用	フラジール内服錠250mg	抗原虫剤	
両採用	フラジール錠250mg	抗トリコモナス剤	
院外採用	ブラダロン錠200mg	頻尿治療剤	
院外採用	プラノバル配合錠	黄体・卵胞ホルモン配合剤	
院外採用	プラバスタチンNa塩錠10mg「タナベ」	高脂血症治療剤	
院外採用	プラバスタチンNa塩錠5mg「タナベ」	高脂血症治療剤	
両採用	プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	高脂血症治療剤	
院外採用	プラバスタチンNa錠10mg「チョーセイ」	高脂血症治療剤	
院外採用	プラビックス錠25mg	抗血小板剤	
院外採用	プラビックス錠75mg	抗血小板剤	
院外採用	プラミベキソール塩酸塩OD錠0.5mg「トーワ」	ドパミン作動性パーキンソン病・レストレスレッグス症候群治療剤	劇
院外採用	プラミベキソール塩酸塩錠0.125mg「アメル」	ドパミン作動性パーキンソン病・レストレスレッグス症候群治療剤	劇
両採用	プラリア皮下注60mgシリンジ	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤	劇
両採用	フランドルテープ40mg	経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤	
院外採用	フランドル錠20mg	持効性虚血性心疾患治療剤	
両採用	プランルカストDS10%「トーワ」	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤	
両採用	プランルカストカプセル112.5mg「日医工」	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤	
院外採用	プランルカストドライシロップ10%「ファイザー」	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤	
院外採用	フリバスOD錠25mg	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤	
院外採用	フリバスOD錠50mg	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤	
院外採用	フリバスOD錠75mg	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤	
院外採用	フリバス錠25mg	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤	
院外採用	フリバス錠50mg	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤	
院外採用	フリバス錠75mg	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤	
院内採用	プリピーシー液0.02%	殺菌消毒剤	
院外採用	プリミドン細粒99.5%「日医工」	抗てんかん剤	
両採用	プリモボラン錠5mg	蛋白同化ステロイド剤	
両採用	フリュザクラカプセル1mg	抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤	劇
両採用	フリュザクラカプセル5mg	抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤	劇
院外採用	プリンペラン錠5	消化器機能異常治療剤	
院外採用	フルイトラン錠1mg	チアジド系降圧利尿剤	
院外採用	フルイトラン錠2mg	チアジド系降圧利尿剤	
両採用	フルービックHAシリンジ		劇
院外採用	フルオシノニドクリーム0.05%「テイコク」	外用合成副腎皮質ホルモン剤	劇
両採用	フルオレサイト静注500mg	蛍光眼底造影剤	
両採用	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	抗悪性腫瘍剤	劇
両採用	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	抗悪性腫瘍剤	劇
両採用	フルオロメトロン点眼液0.02%「ニッター」	抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤	
両採用	フルオロメトロン点眼液0.1%「ニッター」	抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤	
院外採用	フルコートスプレー0.007%	合成副腎皮質ホルモン噴霧液	
院外採用	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	深在性真菌症治療剤	
院外採用	フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」	深在性真菌症治療剤	
両採用	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	ビタミンB1誘導体	
両採用	フルスルチアミン静注50mg「トーワ」	ビタミンB1誘導体	
院外採用	プルゼニド錠12mg	緩下剤	
両採用	フルタイド100μgエアゾール60吸入用	吸入ステロイド喘息治療剤	

院外採用	フルタイド100ディスカス	吸入ステロイド喘息治療剤	
両採用	フルタイド200ディスカス	吸入ステロイド喘息治療剤	
院外採用	フルタイド50μgエアゾール120吸入用	吸入ステロイド喘息治療剤	
院外採用	フルタイド50ディスカス	吸入ステロイド喘息治療剤	
両採用	フルダラ錠10mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両採用	フルダラ静注用50mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両採用	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg 「トーフ」28噴霧用	定量噴霧式鼻過敏症治療剤	
院外採用	フルチカゾン点鼻液50μg「サワイ」28噴霧用	定量噴霧式鼻過敏症治療剤	
院外採用	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	喘息治療配合剤	
両採用	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	喘息治療配合剤	
院外採用	フルティフォーム50エアゾール120吸入用	喘息治療配合剤	
院外採用	フルティフォーム50エアゾール56吸入用	喘息治療配合剤	
院外採用	フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用	定量噴霧式鼻過敏症治療剤	
院外採用	フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用	定量噴霧式鼻過敏症治療剤	
両採用	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	不眠症治療剤	精2
院外採用	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	不眠症治療剤	精2
院外採用	ブルフェン錠200	抗炎症・鎮痛・解熱剤	
院外採用	ブルフェン顆粒20%	抗炎症・鎮痛・解熱剤	
両採用	フルマゼニル注射液0.5mg「F」	ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤	劇
両採用	フルマリン静注用0.5g	オキサセフェム系抗生物質	
両採用	フルマリン静注用1g	オキサセフェム系抗生物質	
院外採用	フルメタローション	皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤	劇
両採用	フルメタ軟膏	皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤	劇
院外採用	フルメトロン点眼液0.02%	抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤	
院外採用	フルメトロン点眼液0.1%	抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤	
院外採用	フルルビプロフェンテープ40mg「QQ」	経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤	
両採用	ブレオ注射用15mg	抗腫瘍性抗生物質	劇
両採用	ブレオ注射用5mg	抗腫瘍性抗生物質	劇
両採用	フレカイニド酢酸塩錠50mg「TE」	頻脈性不整脈治療剤	劇
両採用	プレガバリンOD錠25mg「VTRS」	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤	
両採用	プレガバリンOD錠75mg「VTRS」	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤	
院外採用	プレタールOD錠100mg	抗血小板剤	
院外採用	プレタールOD錠50mg	抗血小板剤	
院外採用	プレディニンOD錠25	免疫抑制剤	
両採用	プレディニンOD錠50	免疫抑制剤	
院外採用	プレディニン錠50	免疫抑制剤	
両採用	プレドニゾン散「タケダ」1%	合成副腎皮質ホルモン剤	
院外採用	プレドニゾン錠「タケダ」5mg	合成副腎皮質ホルモン剤	
両採用	プレドニゾン錠1mg（旭化成）	合成副腎皮質ホルモン剤	
院外採用	プレドニン眼軟膏	眼科用合成副腎皮質ホルモン剤	
両採用	プレドニン錠5mg	合成副腎皮質ホルモン剤	
院外採用	プレドネマ注腸20mg	潰瘍性大腸炎・限局性腸炎治療剤	
両採用	プレバイミス錠240mg	抗サイトメガロウイルス化学療法剤	劇
両採用	プレバイミス点滴静注240mg	抗サイトメガロウイルス化学療法剤	劇
両採用	プレベナー20水性懸濁注		劇
院外採用	プレマリン錠0.625mg	結合型エストロゲン製剤	
院外採用	プレミネント配合錠LD	持続性ARB/利尿薬合剤	
院外採用	プロ・バンサイン錠15mg	抗コリン性鎮痙剤	
両採用	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	眼科検査用試験紙	
院外採用	プログラフカプセル0.5mg	免疫抑制剤	劇
院外採用	プログラフカプセル1mg	免疫抑制剤	劇
院外採用	プログラフカプセル5mg	免疫抑制剤	劇
両採用	プログラフ注射液2mg	免疫抑制剤	劇

両採用	プログラフ顆粒0.2mg	免疫抑制剤	劇
両採用	プログラフ顆粒1mg	免疫抑制剤	劇
院外採用	プロサイリン錠20	PGI2誘導体制剤	劇
両採用	プロジフ静注液200	深在性真菌症治療剤	
両採用	プロスタルモン・F注射液1000	PGF2α製剤	劇
両採用	プロスタンディン軟膏0.003%	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	劇
両採用	フロセミド細粒4%「EMEC」	利尿降圧剤	
院外採用	フロセミド錠10mg「NP」	利尿降圧剤	
院外採用	フロセミド錠20mg「NIG」	利尿降圧剤	
両採用	フロセミド錠20mg「NP」	利尿降圧剤	
院外採用	フロセミド錠40mg「NIG」	利尿降圧剤	
両採用	フロセミド錠40mg「NP」	利尿降圧剤	
両採用	フロセミド注20mg「NIG」	利尿降圧剤	
両採用	プロタノールL注0.2mg	心機能・組織循環促進剤	劇
院外採用	プロタノールS錠15mg	心機能・組織循環促進剤	劇
両採用	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	ヘパリン拮抗剤	
両採用	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	睡眠導入剤	精3
院外採用	プロチゾラム錠0.25mg「トーワ」	睡眠導入剤	精3
院外採用	プロテカジン錠10	H2受容体拮抗剤	
院外採用	プロテカジン錠5	H2受容体拮抗剤	
院外採用	プロトピック軟膏0.1%	アトピー性皮膚炎治療剤	劇
院外採用	プロナーゼMS	胃内粘液溶解除去剤	
院外採用	プロナック点眼液0.1%	非ステロイド抗炎症点眼剤	
院内採用	プロネスパスタアロマ	歯科用表面麻酔剤	劇
院外採用	プロノン錠150mg	不整脈治療剤	劇
院外採用	プロバジル錠50mg	抗甲状腺剤	
両採用	プロハンス静注シリンジ13mL	環状型非イオン性MRI用造影剤	
両採用	プロピレングリコール* (丸石)	溶解剤	
院外採用	プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」	徐放性高血圧・狭心症治療剤	劇
院外採用	プロプレス錠12	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	
院外採用	プロプレス錠2	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	
院外採用	プロプレス錠4	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	
院外採用	プロプレス錠8	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	
両採用	プロベト	軟膏基剤	
両採用	フロベン顆粒8%	鎮痛・抗炎症剤	劇
両採用	プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」	全身麻酔・鎮静剤	劇
両採用	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	全身麻酔・鎮静剤	劇
両採用	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	全身麻酔・鎮静剤	劇
院外採用	プロマックD錠75	亜鉛含有胃潰瘍治療剤	
院外採用	プロマック顆粒15%	亜鉛含有胃潰瘍治療剤	
両採用	プロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	気道粘液溶解剤	
院外採用	プロムヘキシシン塩酸塩錠4mg「サワイ」	気道粘液溶解剤	
院外採用	プロムヘキシシン塩酸塩錠4mg「日医工」	気道粘液溶解剤	
院外採用	プロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)	壊死組織除去剤	
院外採用	フロモックス小児用細粒100mg	セフェム系抗生物質	
院外採用	フロモックス錠100mg	セフェム系抗生物質	
院外採用	フロモックス錠75mg	セフェム系抗生物質	
両採用	フロリードゲル経口用2%	口腔・食道カンジダ症治療剤	
両採用	フロリネフ錠0.1mg	合成鉱質コルチコイド剤	劇
院外採用	ベイスンOD錠0.2	食後過血糖改善剤	
院外採用	ベイスンOD錠0.3	食後過血糖改善剤	
院外採用	ベイスン錠0.2	食後過血糖改善剤	
院外採用	ベイスン錠0.3	食後過血糖改善剤	

院外採用	ベージニオ錠100mg	抗悪性腫瘍剤／CDK4及び6阻害剤	劇
両採用	ベージニオ錠150mg	抗悪性腫瘍剤／CDK4及び6阻害剤	劇
両採用	ベージニオ錠50mg	抗悪性腫瘍剤／CDK4及び6阻害剤	劇
両採用	ベオーバ錠50mg	選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤	
両採用	ベクティビックス点滴静注100mg	抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗EGFRモノクローナル抗体	劇
両採用	ベグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」	持続型G-CSF製剤	
院外採用	ベサコリン散5%	副交感神経亢進剤	劇
院外採用	ベザトールSR錠100mg	高脂血症治療剤	
両採用	ベザトールSR錠200mg	高脂血症治療剤	
両採用	ベサノイドカプセル10mg	急性前骨髄球性白血病治療剤	劇
院外採用	ベザフィブラート徐放錠200mg「JG」	高脂血症治療剤	
院外採用	ベシケアOD錠2.5mg	過活動膀胱治療剤	
院外採用	ベシケアOD錠5mg	過活動膀胱治療剤	
院外採用	ベシケア錠2.5mg	過活動膀胱治療剤	
院外採用	ベシケア錠5mg	過活動膀胱治療剤	
両採用	ベスタチンカプセル30mg	抗悪性腫瘍剤	
両採用	ベストロン点眼用0.5%	セフェム系抗生物質	
院外採用	ベセルナクリーム5%	尖圭コンジローマ治療薬、日光角化症治療薬	
両採用	ベタニス錠25mg	選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤	劇
院外採用	ベタニス錠50mg	選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤	劇
両採用	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」	めまい・平衡障害治療剤	
両採用	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	合成副腎皮質ホルモン剤	
両採用	ベナンボックス注用300mg	カリニ肺炎治療剤	劇
両採用	ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーワ」	高血圧症・狭心症治療剤（持続性Ca拮抗剤）	劇
両採用	ベネクレクスタ錠100mg	抗悪性腫瘍剤／BCL-2阻害剤	劇
両採用	ベネクレクスタ錠10mg	抗悪性腫瘍剤／BCL-2阻害剤	劇
両採用	ベネクレクスタ錠50mg	抗悪性腫瘍剤／BCL-2阻害剤	劇
院外採用	ベネシッド錠250mg	痛風治療剤	
院外採用	ベネット錠17.5mg	骨粗鬆症・骨ページェット病治療剤	劇
院外採用	ベネット錠2.5mg	骨粗鬆症治療剤	劇
両採用	ベネトリン吸入液0.5%	気管支拡張剤	
両採用	ベノキシール点眼液0.4%	眼科用表面麻酔剤	
両採用	ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	抗悪性腫瘍剤／抗VEGFヒト化モノクローナル抗体	劇
両採用	ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	抗悪性腫瘍剤／抗VEGFヒト化モノクローナル抗体	劇
両採用	ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	抗悪性腫瘍剤／抗VEGFヒト化モノクローナル抗体	劇
両採用	ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」	抗悪性腫瘍剤／抗VEGFヒト化モノクローナル抗体	劇
両採用	ヘパティメージ注	肝胆道系疾患・機能診断薬	
両採用	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL	血液凝固阻止剤	
両採用	ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ5mL	血液凝固阻止剤	
両採用	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	血液凝固阻止剤	
両採用	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」	血液凝固阻止剤	
両採用	ヘパリンNa透析用カテーテルロック用1000単位/mLシリンジ5mL「ニプロ」	血液凝固阻止剤	
両採用	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	血液凝固阻止剤	
両採用	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」	血行促進・皮膚保湿剤	
院外採用	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「アメル」	血行促進・皮膚保湿剤	
両採用	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	血行促進・皮膚保湿剤	
両採用	ヘブスブリンIH静注1000単位	血漿分画製剤	特生
両採用	ヘプタボックスーI水性懸濁注シリンジ0.5mL	ウイルスワクチン類	劇
院外採用	ペプリコール錠100mg	頻脈性不整脈・狭心症治療剤	劇
両採用	ペプリコール錠50mg	頻脈性不整脈・狭心症治療剤	劇

両採用	ペブレオ注射用10mg	抗腫瘍性抗生物質	劇
両採用	ペブレオ注射用5mg	抗腫瘍性抗生物質	劇
両採用	ペムリディ錠25mg	抗ウイルス化学療法剤	劇
両採用	ペメトレキセド点滴静注液100mg「トーワ」	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤	劇
両採用	ペメトレキセド点滴静注液500mg「トーワ」	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤	劇
両採用	ヘモクロンカプセル200mg	痔核治療剤	
両採用	ヘモポリゾン軟膏	痔疾治療剤	
院外採用	ベラチンドライシロップ小児用0.1%	閉塞性気道疾患用剤	
両採用	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	Ca拮抗性不整脈・虚血性心疾患治療剤	
両採用	ベラプロストNa錠20μg「VTRS」	PGI2誘導体制剤	劇
院外採用	ペリアクチンシロップ0.04%	抗アレルギー剤	
院外採用	ペリアクチン散1%	抗アレルギー剤	劇
院外採用	ペリアクチン錠4mg	抗アレルギー剤	
院内採用	ペリオドン	根管消毒・治療剤	劇
院外採用	ベリキューボ錠10mg	慢性心不全治療剤	
院外採用	ベリキューボ錠2.5mg	慢性心不全治療剤	
院外採用	ベリキューボ錠5mg	慢性心不全治療剤	
院外採用	ベリチーム配合顆粒	消化酵素剤	
両採用	ベリナートP静注用500	血漿分画製剤	特生
両採用	ベルケイド注射用3mg	抗悪性腫瘍剤／プロテアソーム阻害剤	
院外採用	ベルサンチン錠100mg	抗血小板剤	
院外採用	ベルサンチン錠25mg	冠血管拡張剤, 抗血小板剤	
院外採用	ベルジピンLAカプセル20mg	持続性Ca拮抗剤	
院外採用	ベルジピンLAカプセル40mg	持続性Ca拮抗剤	
院外採用	ベルジピン錠20mg	Ca拮抗性降圧剤	
両採用	ベルソムラ錠15mg	不眠症治療剤	
院外採用	ヘルベッサーRカプセル100mg	持続性Ca拮抗剤	
院外採用	ヘルベッサー錠30	Ca拮抗剤	
院外採用	ペロテックエロゾル100	気管支拡張剤	
院外採用	ベンザリン錠5	睡眠誘導・抗痙攣剤	精3
両採用	ベンザルコニウム塩化物消毒用液10W/V%「VTRS」	殺菌消毒剤	
両採用	ベンタサ坐剤1g	潰瘍性大腸炎治療剤	
院外採用	ベンタサ錠250mg	潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤	
院外採用	ベンタサ錠500mg	潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤	
両採用	ベンタサ注腸1g	潰瘍性大腸炎治療剤	
院外採用	ベンタサ顆粒94%	潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤	
両採用	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」	抗悪性腫瘍剤	劇
院外採用	ペンレステープ18mg	貼付用局所麻酔剤	劇
両採用	ポースデル内用液10	MRI用経口消化管造影剤	
両採用	ポートルーザ点滴静注液800mg	抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗EGFRモノクローナル抗体	劇
両採用	ホクナリンテープ0.5mg	経皮吸収型・気管支拡張剤	
両採用	ホクナリンテープ1mg	経皮吸収型・気管支拡張剤	
両採用	ホクナリンテープ2mg	経皮吸収型・気管支拡張剤	
両採用	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	閉塞性気道疾患用剤	
院外採用	ホクナリン錠1mg	閉塞性気道疾患用剤	
両採用	ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」	糖尿病食後過血糖改善剤	
院外採用	ボグリボース錠0.2mg「YD」	食後過血糖改善剤	
院外採用	ボグリボース錠0.3mg「トーワ」	糖尿病食後過血糖改善剤	
両採用	ボシュリフ錠100mg	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒビター	劇
両採用	ホスコH-15	坐剤基剤	
両採用	ホストイン静注750mg	抗けいれん剤	劇
両採用	ホスミンS静注用2g	ホスホマイシン系抗生物質製剤	

院外採用	ホスミンシンドライシロップ200	ホスホマイシン系抗生物質製剤	
両採用	ホスミンシンドライシロップ400	ホスホマイシン系抗生物質製剤	
院外採用	ホスミン錠250	ホスホマイシン系抗生物質製剤	
両採用	ホスミン錠500	ホスホマイシン系抗生物質製剤	
両採用	ポスミン外用液0.1%	アドレナリン液	
両採用	ポスミン注1mg	アドレナリン注射液	劇
院外採用	ホスリボン配合顆粒	経口リン酸製剤	
院外採用	ホスレノールOD錠250mg	高リン血症治療剤	
院外採用	ホスレノールチュアブル錠250mg	高リン血症治療剤	
院外採用	ホスレノール顆粒分包250mg	高リン血症治療剤	
院外採用	ホスレノール顆粒分包500mg	高リン血症治療剤	
院外採用	ポチシート20%	外用局所収斂剤	
両採用	ポテリジオ点滴静注20mg	抗悪性腫瘍剤/ヒト化抗CCケモカイン受容体4(CCR4)モノクローナル抗体	劇
院外採用	ボナロン経口ゼリー35mg	骨粗鬆症治療剤	劇
院外採用	ボナロン錠35mg	骨粗鬆症治療剤	劇
院外採用	ボナロン錠5mg	骨粗鬆症治療剤	劇
院外採用	ポノサップバック400	ヘリコバクター・ピロリ除菌剤	
院外採用	ポノサップバック800	ヘリコバクター・ピロリ除菌剤	
院外採用	ポノテオ錠50mg	骨粗鬆症治療剤	劇
両採用	ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」	含嗽剤	
両採用	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	殺菌消毒剤	
院外採用	ポビドンヨード外用液10%「VTRS」	殺菌消毒剤	
両採用	ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	殺菌消毒剤	
院外採用	ポピヨドンスクラブ7.5%	殺菌消毒剤	
両採用	ポプスカイン0.5%注50mg/10mL	長時間作用性局所麻酔剤	劇
両採用	ポマリストカプセル1mg	抗造血器悪性腫瘍剤	
両採用	ポマリストカプセル2mg	抗造血器悪性腫瘍剤	
両採用	ポマリストカプセル3mg	抗造血器悪性腫瘍剤	
両採用	ポマリストカプセル4mg	抗造血器悪性腫瘍剤	
院外採用	ボラキス錠2	尿失禁・尿意切迫感・頻尿治療剤	
院外採用	ボラキス錠3	尿失禁・尿意切迫感・頻尿治療剤	
院外採用	ボラザG坐剤	痔核局所治療剤	
両採用	ボラザG軟膏	痔疾用剤	
両採用	ボラプレジックOD錠75mg「サワイ」	亜鉛含有胃潰瘍治療剤	
院外採用	ボララミンシロップ0.04%	抗ヒスタミン剤	
院外採用	ボララミンドライシロップ0.2%	抗ヒスタミン剤	
両採用	ボララミン錠2mg	抗ヒスタミン剤	
両採用	ボララミン注5mg	抗ヒスタミン剤	
両採用	ポリコナゾール錠200mg「DSEP」	深在性真菌症治療剤	劇
院外採用	ポリコナゾール錠200mg「トーフ」	深在性真菌症治療剤	劇
両採用	ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	深在性真菌症治療剤	劇
院外採用	ポリコナゾール錠50mg「トーフ」	深在性真菌症治療剤	劇
院外採用	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	高カリウム血症改善剤	
院外採用	ホリゾン錠2mg	マイナートランキライザー	精3
院外採用	ホリゾン錠5mg	マイナートランキライザー	精3
両採用	ホリナート錠25mg「タイホウ」	還元型葉酸製剤	
院外採用	ポリフル細粒83.3%	過敏性腸症候群治療剤	
両採用	ポリフル錠500mg	過敏性腸症候群治療剤	
院外採用	ボルタレンSRカプセル37.5mg	徐放性鎮痛・抗炎症剤	劇
院外採用	ボルタレングル1%	経皮鎮痛消炎剤	
院外採用	ボルタレンサボ12.5mg	鎮痛・解熱・抗炎症剤	劇
院外採用	ボルタレンサボ25mg	鎮痛・解熱・抗炎症剤	劇

院外採用	ボルタレンサボ50mg	鎮痛・解熱・抗炎症剤	劇
院外採用	ボルタレンテープ15mg	経皮鎮痛消炎剤	
院外採用	ボルタレンテープ30mg	経皮鎮痛消炎剤	
院外採用	ボルタレンローション1%	経皮鎮痛消炎剤	
院外採用	ボルタレン錠25mg	鎮痛・抗炎症剤	劇
両採用	ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」	抗悪性腫瘍剤／プロテアソーム阻害剤	
院外採用	ポルトラック原末	高アンモニア血症治療剤	
両採用	ポリヒール組織接着用	血漿分画製剤	特生
両採用	ポリヒール組織接着用	血漿分画製剤	特生
両採用	ボルベン輸液6%	代用血漿剤	
院外採用	ボンゾール錠100mg	子宮内膜炎・乳腺症治療剤	
院外採用	ポントールカプセル250mg	鎮痛・消炎・解熱剤	
院外採用	ポントールシロップ3.25%	解熱・鎮痛剤	
両採用	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	脊椎麻酔剤	劇
両採用	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	脊椎麻酔剤	劇
院外採用	マーズレンS配合顆粒	胃炎・消化性潰瘍治療剤	
院外採用	マーズレン配合錠1.0ES	胃炎・消化性潰瘍治療剤	
院外採用	マーデュオックス軟膏	尋常性乾癬治療剤	劇
両採用	マイオビュー「注射用」	心臓疾患・心機能診断薬	
院外採用	マイコスポールクリーム1%	抗真菌剤	
院外採用	マイザー軟膏0.05%	外用合成副腎皮質ホルモン剤	
院外採用	マイスタン細粒1%	抗てんかん剤	精3
院外採用	マイスタン錠10mg	抗てんかん剤	精3
院外採用	マイスタン錠5mg	抗てんかん剤	精3
院外採用	マイスリー錠10mg	入眠剤	
院外採用	マイスリー錠5mg	入眠剤	
両採用	マイトマイシン注用2mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両採用	マイロターグ点滴静注用5mg	抗悪性腫瘍剤	
院外採用	マヴィレット配合錠	抗ウイルス化学療法剤	
両採用	マキサカルシトール静注透析用10μg「トーフ」	二次性副甲状腺機能亢進症治療剤	劇
両採用	マキサカルシトール静注透析用2.5μg「トーフ」	二次性副甲状腺機能亢進症治療剤	劇
両採用	マキサカルシトール静注透析用5μg「トーフ」	二次性副甲状腺機能亢進症治療剤	劇
両採用	マキサカルシトール静注透析用シリンジ10μg「イセイ」	二次性副甲状腺機能亢進症治療剤	劇
両採用	マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5μg「イセイ」	二次性副甲状腺機能亢進症治療剤	劇
両採用	マキサカルシトール静注透析用シリンジ5μg「イセイ」	二次性副甲状腺機能亢進症治療剤	劇
両採用	マグコロール散68%分包100g	大腸検査・腹部外科手術前処置用下剤	
両採用	マグコロール内用液13.6%分包250mL	大腸検査・腹部外科手術前処置用下剤	
院外採用	マクサルト錠10mg	片頭痛治療剤	劇
両採用	マグミット錠250mg	制酸・緩下剤	
両採用	マグミット錠330mg	制酸・緩下剤	
両採用	マグミット錠500mg	制酸・緩下剤	
院外採用	マニジピン塩酸塩錠10mg「サワイ」	持続性Ca拮抗降圧剤	劇
院外採用	マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	四環系抗うつ剤	
院外採用	マリゼブ錠12.5mg	糖尿病用剤	
院外採用	マリゼブ錠25mg	糖尿病用剤	
院外採用	マルツエキス分包*（高田）	乳幼児便秘治療剤	
両採用	マルファ懸濁用配合顆粒	消化性潰瘍・胃炎治療剤	
院外採用	マンジャロ皮下注10mgアテオス	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬	劇
院外採用	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬	劇
院外採用	マンジャロ皮下注15mgアテオス	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬	劇
両採用	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬	劇

両採用	マンジャロ皮下注5mg アテオス	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬	劇
院外採用	マンジャロ皮下注7.5mg アテオス	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬	劇
両採用	ミオMIBG-1123注射液	心交感神経診断薬・神経芽腫診断薬・褐色神経細胞腫診断薬	
院外採用	ミオコールスプレー0.3mg	定量噴霧式・ニトログリセリン舌下スプレー剤	劇
院外採用	ミオナール錠50mg	筋緊張改善剤	
院外採用	ミオピン点眼液	調節機能改善点眼剤	
両採用	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	キャンディン系抗真菌剤	劇
院外採用	ミカムロ配合錠AP	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/持続性Ca拮抗薬合剤	劇
院外採用	ミカムロ配合錠BP	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/持続性Ca拮抗薬合剤	劇
院外採用	ミカルディス錠20mg	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー	
院外採用	ミカルディス錠40mg	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー	
院外採用	ミカルディス錠80mg	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー	
院外採用	ミグシス錠5mg	片頭痛治療剤	
両採用	ミグリトールOD錠50mg「トーワ」	糖尿病食後過血糖改善剤	
院外採用	ミケランLAカプセル15mg	徐放性高血圧治療剤	
院外採用	ミケランLA点眼液2%	緑内障・高眼圧症治療剤	
院外採用	ミケラン点眼液2%	緑内障・高眼圧症治療剤	
院外採用	ミケルナ配合点眼液	緑内障・高眼圧症治療剤	
両採用	ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTR S」	免疫抑制剤	劇
院外採用	ミコプティンカプセル150mg	抗酸菌症治療薬	
院外採用	ミコンビ配合錠AP	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/利尿薬合剤	
院外採用	ミコンビ配合錠BP	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/利尿薬合剤	
両採用	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	催眠鎮静剤	精3
両採用	ミダゾラム注射液10mg「テバ」	催眠鎮静剤	
両採用	ミダフレッサ静注0.1%	抗けいれん剤	
両採用	ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」	速効型インスリン分泌促進薬	
院外採用	ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」	速効型インスリン分泌促進薬	
両採用	ミッドベリックL135腹膜透析液	腹膜透析液	
両採用	ミッドベリックL135腹膜透析液	腹膜透析液	
両採用	ミドリンM点眼液0.4%	調節麻痺・散瞳点眼剤	
両採用	ミドリンP点眼液	検査用散瞳点眼剤	
院外採用	ミノトロテープ27mg	経皮吸収型・心疾患治療剤	劇
院外採用	ミニプレス錠0.5mg	高血圧・排尿障害治療剤	
院外採用	ミニリンメルトOD錠120μg	ペプチイド系抗利尿ホルモン用剤	劇
院外採用	ミニリンメルトOD錠240μg	ペプチイド系抗利尿ホルモン用剤	劇
院外採用	ミニリンメルトOD錠25μg	脳下垂体ホルモン剤	劇
両採用	ミネプロ錠2.5mg	選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー	
院外採用	ミネプロ錠5mg	選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー	
院内採用	ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」	歯周炎治療剤	
院外採用	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーワ」	TC系抗生物質	
両採用	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	TC系抗生物質	
院外採用	ミノマイシンカプセル100mg	TC系抗生物質	
院外採用	ミノマイシン錠100mg	TC系抗生物質	
両採用	ミノマイシン錠50mg	TC系抗生物質	
両採用	ミノマイシン顆粒2%	TC系抗生物質	
両採用	ミヤBM細粒	生菌製剤	
両採用	ミヤBM錠	生菌製剤	
両採用	ミラクリッド注射液10万単位	多価・酵素阻害剤	
両採用	ミラクリッド注射液5万単位	多価・酵素阻害剤	
院外採用	ミラベックスLA錠1.5mg	ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤	劇

院外採用	ミリステープ5mg	経皮吸収型・心疾患治療剤	劇
両採用	ミルセラ注シリンジ100μg	持続型赤血球造血刺激因子製剤	劇
両採用	ミルセラ注シリンジ12.5μg	持続型赤血球造血刺激因子製剤	劇
両採用	ミルセラ注シリンジ250μg	持続型赤血球造血刺激因子製剤	劇
両採用	ミルセラ注シリンジ25μg	持続型赤血球造血刺激因子製剤	劇
両採用	ミルセラ注シリンジ50μg	持続型赤血球造血刺激因子製剤	劇
両採用	ミルタザピンOD錠15mg「トーワ」	ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤	劇
院外採用	ミルタックスパップ30mg	経皮鎮痛消炎剤	
院外採用	ミルラクト細粒50%	乳糖分解酵素剤	
両採用	ミレーナ52mg	子宮内黄体ホルモン放出システム	
院外採用	ミンザイン錠0.25mg	睡眠導入剤	
両採用	ムコサルドライシロップ1.5%	気道潤滑去たん剤	
院外採用	ムコサル錠15mg	気道潤滑去たん剤	
院外採用	ムコスタ錠100mg	胃炎・胃潰瘍治療剤	
両採用	ムコスタ点眼液UD2%	ドライアイ治療剤	
院外採用	ムコソルバンL錠45mg	徐放性気道潤滑去たん剤	
院外採用	ムコソルバン錠15mg	気道潤滑去たん剤	
院外採用	ムコダインDS50%	気道粘液調整・粘膜正常化剤	
院外採用	ムコダインシロップ5%	気道粘液調整・粘膜正常化剤	
院外採用	ムコダイン錠250mg	気道粘液調整・粘膜正常化剤	
院外採用	ムコダイン錠500mg	気道粘液調整・粘膜正常化剤	
両採用	ムコフィリン吸入液20%	気道粘液溶解剤	
院外採用	メイアクトMS小児用細粒10%	セフェム系抗生物質	
院外採用	メイアクトMS錠100mg	セフェム系抗生物質	
院外採用	メイラックス錠1mg	持続性心身安定剤	
院外採用	メイラックス錠2mg	持続性心身安定剤	
両採用	メイロン静注7%	制酸・中和剤	
両採用	メイロン静注7%	制酸・中和剤	
院外採用	メインテート錠0.625mg	選択的β1アンタゴニスト	
院外採用	メインテート錠2.5mg	選択的β1アンタゴニスト	
院外採用	メインテート錠5mg	選択的β1アンタゴニスト	
院外採用	メキシチールカプセル100mg	不整脈・糖尿病性神経障害治療剤	劇
院外採用	メキシチールカプセル50mg	不整脈・糖尿病性神経障害治療剤	劇
両採用	メキシレチン塩酸塩錠100mg「杏林」	不整脈・糖尿病性神経障害治療剤	劇
両採用	メキニスト錠2mg	抗悪性腫瘍剤/MEK阻害剤	劇
両採用	メクトビ錠15mg	抗悪性腫瘍剤/MEK阻害剤	劇
院外採用	メコパラミン錠500(ツルハラ)	末梢性神経障害治療剤	
院外採用	メジコン散10%	鎮咳剤	劇
院外採用	メジコン錠15mg	鎮咳剤	
院外採用	メソトレキセート錠2.5mg	葉酸代謝拮抗剤	劇
両採用	メソトレキセート点滴静注液1000mg	葉酸代謝拮抗剤	劇
両採用	メソトレキセート点滴静注液200mg	葉酸代謝拮抗剤	劇
院外採用	メタクト配合錠LD	2型糖尿病治療剤	劇
院外採用	メチコバル細粒0.1%	末梢性神経障害治療剤	
院外採用	メチコバル錠250μg	末梢性神経障害治療剤	
両採用	メチコバル錠500μg	末梢性神経障害治療剤	
両採用	メチコバル注射液500μg	末梢性神経障害治療剤	
院外採用	メチルジゴキシン錠0.05mg「タイヨー」	強心配糖体製剤	劇
両採用	メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」	強心配糖体製剤	劇
院外採用	メチルジゴキシン錠0.1mg「タイヨー」	強心配糖体製剤	劇
院外採用	メトアナ配合錠HD	2型糖尿病治療剤	劇
院外採用	メトアナ配合錠LD	2型糖尿病治療剤	劇
院外採用	メトグルコ錠250mg	血糖降下剤	劇
院外採用	メトグルコ錠500mg	血糖降下剤	劇

両採用	メトクロプラミド錠5mg「トーワ」	消化器機能異常治療剤	
両採用	メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL	抗リウマチ剤	劇
両採用	メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL	抗リウマチ剤	劇
院外採用	メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL	抗リウマチ剤	劇
両採用	メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL	抗リウマチ剤	劇
院外採用	メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL	抗リウマチ剤	劇
両採用	メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL	抗リウマチ剤	劇
両採用	メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL	抗リウマチ剤	劇
院外採用	メトピロンカプセル250mg	下垂体ACTH分泌機能検査薬, 副腎皮質ホルモン合成阻害剤	
両採用	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」	血糖降下剤	劇
両採用	メトリジンD錠2mg	低血圧治療剤	
院外採用	メトリジン錠2mg	低血圧治療剤	
両採用	メドロール錠4mg	合成副腎皮質ホルモン剤	
院外採用	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」	黄体ホルモン製剤	
院外採用	メトロニダゾール錠(阪急)	抗トリコモナス剤	
両採用	メナテトレノンカプセル15mg「トーワ」	骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤	
院外採用	メネシット配合錠100	パーキンソニズム治療剤	
両採用	メノエイドコンビパッチ	経皮吸収型卵胞・黄体ホルモン製剤	
院外採用	メパロチン錠10	高脂血症治療剤	
院外採用	メパロチン錠5	高脂血症治療剤	
両採用	メファキン「ヒサミツ」錠275	抗マラリア剤	
両採用	メプチンエア-10μg吸入100回	定量噴霧式気管支拡張剤	
院外採用	メプチンキッドエア-5μg吸入100回	定量噴霧式気管支拡張剤	
両採用	メプチンシロップ5μg/mL	気管支拡張剤	
院外採用	メプチンシングヘラー10μg吸入100回	ドライパウダー吸入式気管支拡張剤	
院外採用	メプチンドライシロップ0.005%	気管支拡張剤	
院外採用	メプチンミニ錠25μg	気管支拡張剤	
両採用	メプチン吸入液0.01%	気管支拡張剤	
両採用	メプチン吸入液ユニット0.3mL	気管支拡張剤	
院外採用	メプチン錠50μg	気管支拡張剤	
院外採用	メマリーOD錠10mg	アルツハイマー型認知症治療剤	劇
院外採用	メマリーOD錠20mg	アルツハイマー型認知症治療剤	劇
院外採用	メマリーOD錠5mg	アルツハイマー型認知症治療剤	劇
院外採用	メマリー錠10mg	アルツハイマー型認知症治療剤	劇
院外採用	メマリー錠20mg	アルツハイマー型認知症治療剤	劇
院外採用	メマリー錠5mg	アルツハイマー型認知症治療剤	劇
両採用	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「トーワ」	アルツハイマー型認知症治療剤	劇
院外採用	メリスロン錠12mg	めまい・平衡障害治療剤	
院外採用	メリスロン錠6mg	めまい・平衡障害治療剤	
両採用	メルカゾール錠5mg	抗甲状腺剤	
両採用	メロペネム点滴静注用0.5g「トーワ」	カルバペネム系抗生物質	
両採用	メロペン点滴用バイアル0.5g	カルバペネム系抗生物質	
院外採用	モービック錠10mg	非ステロイド性消炎・鎮痛剤	
院外採用	モーラステープ20mg	経皮鎮痛消炎剤	
院外採用	モーラステープL40mg	経皮鎮痛消炎剤	
院外採用	モーラスパップ30mg	経皮鎮痛消炎剤	
院外採用	モーラスパップ60mg	経皮鎮痛消炎剤	
院外採用	モーラスパップXR120mg	経皮鎮痛消炎剤	
院外採用	モーラスパップXR240mg	経皮鎮痛消炎剤	
両採用	モサプリドクエン酸塩錠5mg「N.P」	消化管運動機能改善剤	
院外採用	モサプリドクエン酸塩錠5mg「アメル」	消化管運動機能改善剤	
両採用	モゾビル皮下注24mg	CXCR4ケモカイン受容体拮抗剤	劇

院外採用	モディオダール錠100mg	精神神経用剤	劇
院外採用	モニラック・シロップ65%	生理的腸管機能改善・高アンモニア血症用剤	
院外採用	モビコール配合内用剤LD	慢性便秘症治療剤	
院外採用	モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	鎮痛・鎮静剤	麻
両採用	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」	鎮痛・鎮静剤	麻劇
両採用	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「タケダ」	鎮痛・鎮静剤	麻劇
両採用	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タケダ」	鎮痛・鎮静剤	麻劇
両採用	モンテルカストOD錠10mg「トーワ」	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤	
院外採用	モンテルカストOD錠5mg「トーワ」	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤	
両採用	モンテルカストチュアブル錠5mg「サワイ」	気管支喘息治療剤	
両採用	モンテルカスト細粒4mg「トーワ」	気管支喘息治療剤	
院外採用	ヤーズフレックス配合錠	子宮内膜症に伴う疼痛改善剤・月経困難症治療剤	
院外採用	ヤーズ配合錠	月経困難症治療剤	
両採用	ヤーボイ点滴静注液20mg	抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗ヒトCTLA-4モノクローナル抗体	劇
両採用	ヤーボイ点滴静注液50mg	抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗ヒトCTLA-4モノクローナル抗体	劇
院外採用	ヤクバンテープ20mg	経皮吸収型鎮痛消炎プラスター剤	
院外採用	ヤクバンテープ40mg	経皮吸収型鎮痛消炎プラスター剤	
院外採用	ユーエフティE配合顆粒T100	代謝拮抗剤	劇
院外採用	ユーエフティE配合顆粒T150	代謝拮抗剤	劇
両採用	ユーエフティ配合カプセルT100	代謝拮抗剤	劇
院外採用	ユーゼル錠25mg	還元型葉酸製剤	
両採用	ユービット錠100mg	ヘリコバクター・ピロリ感染診断用剤	
院外採用	ユーロジン1mg錠	睡眠剤	
院外採用	ユーロジン2mg錠	睡眠剤	
両採用	ユナシン細粒小児用10%	合成ペニシリン製剤	
院外採用	ユナシン錠375mg	合成ペニシリン製剤	
院外採用	ユニシア配合錠HD	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬／持続性Ca拮抗薬配合剤	劇
院外採用	ユニシア配合錠LD	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬／持続性Ca拮抗薬配合剤	劇
両採用	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	悪性胸水治療剤	
院外採用	ユニフィルLA錠200mg	気管支拡張剤	劇
院外採用	ユニフィルLA錠400mg	気管支拡張剤	劇
院外採用	ユベラNカプセル100mg	微小循環系賦活剤	
院外採用	ユベラNソフトカプセル200mg	微小循環系賦活剤	
院外採用	ユベラ錠50mg	ビタミンE剤	
院外採用	ユベラ軟膏	外用ビタミンE・A剤	
院外採用	ユリーフOD錠4mg	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬	劇
院外採用	ユリーフ錠4mg	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬	劇
院外採用	ユリス錠0.5mg	高尿酸血症治療剤	
両採用	ユリス錠1mg	高尿酸血症治療剤	
院外採用	ユリス錠2mg	高尿酸血症治療剤	
院外採用	ユリノーム錠25mg	尿酸排泄剤	劇
両採用	ユリノーム錠50mg	尿酸排泄剤	劇
両採用	ヨウ化カリウム* (山善)	ヨウ素製剤	劇
両採用	ヨウ化カリウム「ホエイ」	ヨウ素製剤	劇
院外採用	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	無機質製剤	
院内採用	ヨウ化ナトリウムカプセル-1号	甲状腺疾患治療薬・診断薬	
院内採用	ヨウ化ナトリウムカプセル-3号	甲状腺疾患治療薬・診断薬	
両採用	ヨウ素「コザカイ・M」	殺菌消毒剤	劇
院外採用	ヨードカプセル-123	甲状腺疾患診断薬	
両採用	ヨンデリス点滴静注用0.25mg	抗悪性腫瘍剤	

両採用	ヨンデリス点滴静注用1mg	抗悪性腫瘍剤	
両採用	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	溶解インスリンアナログ製剤	劇
両採用	ライブリバント点滴静注350mg	抗悪性腫瘍剤/抗ヒトEGFR及び抗ヒトMETヒト二重特異性モノクローナル抗体	劇
院外採用	ラキソベロン錠2.5mg	緩下剤	
院外採用	ラキソベロン内用液0.75%	滴剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤	
院外採用	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	二糖類製剤	
院外採用	ラクツロース・シロップ60%分包10mL「コーワ」	二糖類製剤	
両採用	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	高アンモニア血症・腸管機能改善剤	
院外採用	ラクティオンパップ70mg	経皮吸収型鎮痛・消炎温感貼付剤	
両採用	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	生理的腸管機能改善・高アンモニア血症用剤	
院外採用	ラクリミン点眼液0.05%	流涙症治療点眼剤	
両採用	ラゲブリオカプセル200mg	抗ウイルス剤	劇
院内採用	ラコールNF配合経腸用液	経腸栄養剤	
両採用	ラコールNF配合経腸用半固形剤	経腸栄養剤	
院外採用	ラシックス錠10mg	利尿降圧剤	
院外採用	ラシックス錠20mg	利尿降圧剤	
院外採用	ラシックス錠40mg	利尿降圧剤	
院外採用	ラジレス錠150mg	直接的レニン阻害剤	
両採用	ラズクルーズ錠240mg		
両採用	ラズクルーズ錠80mg		
両採用	ラステットSカプセル25mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両採用	ラスビック錠75mg	ニューキノロン系経口抗菌剤	
両採用	ラスビック点滴静注キット150mg	ニューキノロン系抗菌剤	劇
両採用	ラスリテック点滴静注用1.5mg	がん化学療法用尿酸分解酵素製剤	劇
両採用	ラスリテック点滴静注用7.5mg	がん化学療法用尿酸分解酵素製剤	劇
両採用	ラタノプロスト点眼液0.005%「TS」	緑内障・高眼圧症治療剤	
院外採用	ラタノプロスト点眼液0.005%「サワイ」	緑内障・高眼圧症治療剤	
院外採用	ラックビー錠	整腸剤	
両採用	ラックビー微粒N	整腸剤	
院外採用	ラニラビッド錠0.05mg	強心配糖体製剤	劇
両採用	ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg	抗インフルエンザウイルス剤	
両採用	ラビピュール筋注用	ウイルスワクチン類	劇
院外採用	ラベキュアバック400	ヘリコバクター・ピロリ除菌剤	
院外採用	ラベキュアバック800	ヘリコバクター・ピロリ除菌剤	
院外採用	ラベタロール塩酸塩錠50mg「トーワ」	$\alpha\beta$ 遮断性降圧剤	劇
院外採用	ラベファインバック	ヘリコバクター・ピロリ除菌剤	
院外採用	ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」	プロトンポンプ阻害剤	
両採用	ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	プロトンポンプ・インヒビター	
両採用	ラポナール注射用0.5g	全身麻酔剤	劇
院外採用	ラミクタール錠100mg	抗てんかん剤・双極性障害治療薬	劇
院外採用	ラミクタール錠25mg	抗てんかん剤・双極性障害治療薬	劇
院外採用	ラミクタール錠小児用2mg	抗てんかん剤	劇
院外採用	ラミクタール錠小児用5mg	抗てんかん剤	劇
院外採用	ラミシールクリーム1%	アリルアミン系抗真菌剤	
院外採用	ラミシール錠125mg	アリルアミン系抗真菌剤	
両採用	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	メラトニン受容体アゴニスト	
院外採用	ラモトリギン錠25mg「トーワ」	抗てんかん剤・双極性障害治療薬	劇
院外採用	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	プロトンポンプ・インヒビター	
両採用	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	プロトンポンプ・インヒビター	
院外採用	ランソプラゾールカプセル15mg「アメル」	プロトンポンプ・インヒビター	
両採用	ランタスXR注ソロスター	持効型溶解インスリンアナログ製剤	劇
院外採用	ランタス注カート	持効型溶解インスリンアナログ製剤	劇
院外採用	ランタス注ソロスター	持効型溶解インスリンアナログ製剤	劇

院外採用	ランデル錠 20	持続性Ca拮抗剤	劇
院外採用	ランプレンカプセル 50mg	ハンセン病治療薬	
両採用	ランマーク皮下注 120mg	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤	劇
両採用	リアルダ錠 1200mg	潰瘍性大腸炎治療剤	
院外採用	リーゼ錠 5mg	心身安定剤	精3
両採用	リーバクト配合顆粒	分岐鎖アミノ酸製剤	
両採用	リーマス錠 100	躁病・躁状態治療剤	劇
両採用	リウマトレックスカプセル 2mg	抗リウマチ剤	劇
両採用	リオナ錠 250mg	高リン血症・鉄欠乏性貧血治療剤	
院外採用	リオベル配合錠 HD	2型糖尿病治療剤	
院外採用	リオベル配合錠 LD	2型糖尿病治療剤	
両採用	リオレサル錠 5mg	抗痙縮剤	劇
院外採用	リカルボン錠 50mg	骨粗鬆症治療剤	劇
院外採用	リクスミア皮下注 300μg	GLP-1受容体作動薬	劇
院外採用	リクシアナOD錠 15mg	経口FXa阻害剤	
両採用	リクシアナOD錠 30mg	経口FXa阻害剤	
院外採用	リクシアナ錠 30mg	経口FXa阻害剤	
院外採用	リクシアナ錠 60mg	経口FXa阻害剤	
両採用	リクラスト点滴静注液 5mg	骨粗鬆症治療剤	劇
両採用	リクラスト点滴静注液 5mg	骨粗鬆症治療剤	劇
両採用	リコモジュリン点滴静注用 12800	血液凝固阻止剤	
両採用	リサイオ点滴静注液 100mg	造血幹細胞移植前治療薬	劇
院外採用	リザベンカプセル 100mg	アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤	
院外採用	リザベン点眼液 0.5%	アレルギー性結膜炎治療剤	
院外採用	リスパダールOD錠 0.5mg	抗精神病剤	劇
院外採用	リスパダールOD錠 1mg	抗精神病剤	劇
院外採用	リスパダール細粒 1%	抗精神病剤	劇
院外採用	リスパダール錠 1mg	抗精神病剤	劇
院外採用	リスパダール内用液 1mg/mL	抗精神病剤	劇
院外採用	リスベリドン内用液 1mg/mL 「トーワ」	抗精神病剤	劇
両採用	リスベリドン内用液 1mg/mL 「ヨシトミ」	抗精神病剤	劇
院外採用	リスミー錠 1mg	睡眠誘導剤	
両採用	リスミー錠 2mg	睡眠誘導剤	
院外採用	リズミック錠 10mg	本態性・起立性・透析時低血圧治療剤	
両採用	リスモダンP静注 50mg	不整脈治療剤	劇
院外採用	リスモダンR錠 150mg	徐放性不整脈治療剤	劇
院外採用	リスモダンカプセル 100mg	不整脈治療剤	劇
両採用	リゾビスト注	MRI用肝臓造影剤	
両採用	リツキサン点滴静注 100mg	抗CD20モノクローナル抗体	
両採用	リツキサン点滴静注 500mg	抗CD20モノクローナル抗体	
両採用	リツキシマブBS点滴静注 100mg 「KHK」	抗CD20モノクローナル抗体	
両採用	リツキシマブBS点滴静注 500mg 「KHK」	抗CD20モノクローナル抗体	
両採用	リドカインテープ 18mg 「YP」	貼付用局所麻酔剤	劇
両採用	リドカイン塩酸塩ビスカス 2% 「日新」	表面麻酔剤	劇
院外採用	リトドリン塩酸塩錠 5mg 「F」	切迫流・早産治療剤	
院外採用	リドメックスコーワローション 0.3%	外用副腎皮質ホルモン剤	
両採用	リネゾリド錠 600mg 「サワイ」	オキサゾリジノン系合成抗菌剤	
両採用	リネゾリド点滴静注 600mg/300mL 「HK」	オキサゾリジノン系合成抗菌剤	
院外採用	リパクレオンカプセル 150mg	膵消化酵素補充剤	
両採用	リパクレオン顆粒 300mg 分包	膵消化酵素補充剤	
院外採用	リバスタッチパッチ 13.5mg	アルツハイマー型認知症治療剤	劇
院外採用	リバスタッチパッチ 18mg	アルツハイマー型認知症治療剤	劇
院外採用	リバスタッチパッチ 4.5mg	アルツハイマー型認知症治療剤	劇
院外採用	リバスタッチパッチ 9mg	アルツハイマー型認知症治療剤	劇

両採用	リバスチグミンテープ9mg「DSEP」	アルツハイマー型認知症治療剤	劇
院外採用	リバゼブ配合錠HD	HMG-COA還元酵素阻害剤/小腸コレステロールトランスポーター阻害剤配合剤	
院外採用	リバゼブ配合錠LD	HMG-COA還元酵素阻害剤/小腸コレステロールトランスポーター阻害剤配合剤	
院外採用	リバロ錠1mg	HMG-COA還元酵素阻害剤	
院外採用	リバロ錠2mg	HMG-COA還元酵素阻害剤	
院外採用	リバロ錠4mg	HMG-COA還元酵素阻害剤	
両採用	リピオドール480注10mL	リンパ系・子宮卵管造影剤/医薬品又は医療機器の調整剤	
院外採用	リビトール錠10mg	HMG-COA還元酵素阻害剤	
院外採用	リビトール錠5mg	HMG-COA還元酵素阻害剤	
院外採用	リファジンカプセル150mg	抗酸菌症治療薬	
両採用	リファンピシカプセル150mg「サンド」	抗酸菌症治療薬	
両採用	リフキシマ錠200mg	難吸収性リファマイシン系抗菌剤	
院外採用	リフヌア錠45mg	咳嗽治療薬	
両採用	リプルキット注10μg	PGE1製剤	劇
院外採用	リフレックス錠15mg	ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤	劇
院外採用	リベルサス錠14mg	2型糖尿病治療剤	劇
院外採用	リベルサス錠3mg	2型糖尿病治療剤	劇
院外採用	リベルサス錠7mg	2型糖尿病治療剤	劇
院外採用	リボスチン点眼液0.025%	H1ブロッカー点眼剤	
院外採用	リボトリアル細粒0.1%	抗てんかん剤	
両採用	リボトリアル錠0.5mg	抗てんかん剤	
院外採用	リポバス錠10	高脂血症治療剤	
院外採用	リポバス錠5	高脂血症治療剤	
院外採用	リマチル錠100mg	抗リウマチ剤	劇
両採用	リマチル錠50mg	抗リウマチ剤	劇
両採用	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	PGE1誘導体制剤	
院外採用	リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」	PGE1誘導体制剤	
両採用	リムパーザ錠100mg	抗悪性腫瘍剤/ポリアデノシン5'ニリン酸リボースポリメラーゼ(PARP)阻害剤	劇
両採用	リムパーザ錠150mg	抗悪性腫瘍剤/ポリアデノシン5'ニリン酸リボースポリメラーゼ(PARP)阻害剤	劇
両採用	リユープリンPRO注射用キット22.5mg	LH-RH誘導体徐放性製剤	劇
両採用	リユープリンSR注射用キット11.25	LH-RH誘導体徐放性製剤	劇
両採用	リユープリン注射用1.88	LH-RH誘導体徐放性製剤	劇
両採用	リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	LH-RH誘導体徐放性製剤	劇
院外採用	リリカOD錠150mg	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤	
院外採用	リリカOD錠25mg	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤	
院外採用	リリカOD錠75mg	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤	
院外採用	リリカカプセル150mg	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤	
院外採用	リリカカプセル25mg	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤	
院外採用	リリカカプセル75mg	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤	
両採用	リレンザ	抗インフルエンザウイルス剤	
院外採用	リンヴォック錠15mg	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤	劇
院外採用	リンヴォック錠7.5mg	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤	劇
両採用	リンゼス錠0.25mg	グアニル酸シクラーゼC受容体アゴニスト	
両採用	リンデロン-VGクリーム0.12%	皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤	
両採用	リンデロン-VGローション	皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤	
両採用	リンデロン-VG軟膏0.12%	皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤	
両採用	リンデロン-Vクリーム0.12%	皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤	
両採用	リンデロン-V軟膏0.12%	皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤	

院外採用	リンデロン坐剤1.0mg	合成副腎皮質ホルモン剤	
院外採用	リンデロン錠0.5mg	合成副腎皮質ホルモン剤	
両採用	リンデロン注2mg(0.4%)	合成副腎皮質ホルモン剤	
両採用	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	合成副腎皮質ホルモン剤	
両採用	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	補正用電解質液	
院外採用	ル・エストロジェル0.06%	経皮吸収エストラジオール製剤	
院外採用	ルジオミール錠10mg	四環系抗うつ剤	
院外採用	ルセフィ錠2.5mg	2型糖尿病治療剤	
院外採用	ルナベル配合錠LD	月経困難症治療剤	
両採用	ルナベル配合錠ULD	月経困難症治療剤	
院外採用	ルネスタ錠1mg	不眠症治療剤	
院外採用	ルネスタ錠2mg	不眠症治療剤	
院外採用	ルネスタ錠3mg	不眠症治療剤	
院外採用	ルバフィン錠10mg	アレルギー性疾患治療剤	
院外採用	ルブラック錠4mg	ループ利尿剤	
院外採用	ルブラック錠8mg	ループ利尿剤	
院外採用	ルボックス錠25	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	
院外採用	ルマケラス錠120mg	抗悪性腫瘍剤/KRAS G12C阻害剤	劇
院外採用	ルミガン点眼液0.03%	緑内障・高眼圧症治療剤	
院外採用	ルミセフ皮下注210mgシリンジ	ヒト型抗ヒトIL-17受容体Aモノクローナル抗体製剤	劇
院外採用	ルムジェブ注ミリオペン	抗糖尿病剤	劇
両採用	ルムジェブ注ミリオペンHD	抗糖尿病剤	劇
院外採用	レキソタン錠2	精神神経用剤	精3
両採用	レギチーン注射液5mg	褐色細胞腫用αブロッカー	
院外採用	レキップCR錠2mg	徐放性ドパミンD2受容体系作動薬	劇
院外採用	レキップCR錠8mg	徐放性ドパミンD2受容体系作動薬	劇
院外採用	レキップ錠0.25mg	ドパミンD2受容体系作動薬	劇
院外採用	レキップ錠1mg	ドパミンD2受容体系作動薬	劇
院外採用	レキップ錠2mg	ドパミンD2受容体系作動薬	劇
両採用	レギュニールLCa1.5腹膜透析液	腹膜透析液	
両採用	レギュニールLCa2.5腹膜透析液	腹膜透析液	
院外採用	レクサプロ錠10mg	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	劇
両採用	レクタブル2mg注腸フォーム14回	潰瘍性大腸炎治療剤	
院外採用	レグナイト錠300mg	レストレスレッグス症候群治療剤	
院外採用	レグバラ錠25mg	カルシウム受容体作動薬	
院外採用	レザルタス配合錠HD	高親和性ARB/持続性Ca拮抗薬配合剤	
院外採用	レザルタス配合錠LD	高親和性ARB/持続性Ca拮抗薬配合剤	
院外採用	レスキュラ点眼液0.12%	イオンチャンネル開口薬/緑内障・高眼圧症治療剤	
院外採用	レスタミンコーワクリーム1%	アレルギー性疾患治療剤	
両採用	レスタミンコーワ錠10mg	アレルギー性疾患治療剤	
両採用	レスプレ錠20mg	鎮咳・気道粘液溶解剤	
院外採用	レスプレ錠30mg	鎮咳・気道粘液溶解剤	
両採用	レダマイシンカプセル150mg	TC系抗生物質	
院外採用	レットヴィモカプセル40mg	抗悪性腫瘍剤/RET受容体型チロシンキナーゼ阻害剤	劇
両採用	レットヴィモカプセル80mg	抗悪性腫瘍剤/RET受容体型チロシンキナーゼ阻害剤	劇
両採用	レトロゾール錠2.5mg「トーワ」	アロマターゼ阻害剤	劇
両採用	レナデックス錠4mg	副腎皮質ホルモン剤	

両採用	レナリドミドカプセル5mg「BMSH」	抗造血器悪性腫瘍剤	
院外採用	レニベース錠10	持続性ACE阻害剤	
院外採用	レニベース錠2.5	持続性ACE阻害剤	
院外採用	レニベース錠5	持続性ACE阻害剤	
院外採用	レパーサ皮下注140mgペン	ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤	
院外採用	レパーサ皮下注420mgオートミドローザー	ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤	
両採用	レバグリニド錠0.25mg「サワイ」	速効型インスリン分泌促進剤	劇
両採用	レバチオ錠20mg	ホスホジエステラーゼ5阻害薬	
院外採用	レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」	ドライアイ治療剤	
院外採用	レバミピド錠100mg「EMEC」	胃炎・胃潰瘍治療剤	
両採用	レバミピド錠100mg「オーツカ」	胃炎・胃潰瘍治療剤	
両採用	レブラミドカプセル5mg	抗造血器悪性腫瘍剤	
院外採用	レプリントン配合錠L100	抗パーキンソン剤	
両採用	レプロジル皮下注用25mg	赤血球成熟促進薬	劇
両採用	レプロジル皮下注用75mg	赤血球成熟促進薬	劇
院外採用	レベタン坐剤0.2mg	鎮痛剤	劇
両採用	レベタン注0.2mg	鎮痛剤	劇
両採用	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	抗てんかん剤	
両採用	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	抗てんかん剤	
院外採用	レベトールカプセル200mg	抗ウイルス剤	劇
両採用	レベニン散	整腸剤	
院外採用	レベミル注 イノレット	持効型溶解インスリンアナログ製剤	劇
院外採用	レベミル注 フレックスペン	持効型溶解インスリンアナログ製剤	劇
院外採用	レベミル注 ペンフィル	持効型溶解インスリンアナログ製剤	劇
両採用	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「ニプロ」	レボカルニチン製剤	
院外採用	レボトミン錠50mg	精神神経安定剤	劇
院外採用	レボトミン錠5mg	精神神経安定剤	
両採用	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	広範囲経口抗菌製剤	
院外採用	レボフロキサシン点眼液0.5%「VTRS」	広範囲抗菌点眼剤	
両採用	レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」	広範囲抗菌点眼剤	
両採用	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	ニューキノロン系抗菌剤	
両採用	レボホリナート点滴静注用100mg「NK」	活性型葉酸製剤	
両採用	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	活性型葉酸製剤	
両採用	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	活性型葉酸製剤	
両採用	レボレード錠12.5mg	経口造血刺激薬	劇
両採用	レボレード錠25mg	経口造血刺激薬	劇
両採用	レミケード点滴静注用100	抗ヒトTNF $\alpha$ モノクローナル抗体製剤	劇
院外採用	レミッチOD錠2.5 $\mu$ g	そう痒症改善剤	劇
院外採用	レミッチカプセル2.5 $\mu$ g	そう痒症改善剤	劇
院外採用	レミニールOD錠12mg	アルツハイマー型認知症治療剤	劇
院外採用	レミニールOD錠8mg	アルツハイマー型認知症治療剤	劇
院外採用	レミニール錠4mg	アルツハイマー型認知症治療剤	劇
院外採用	レミニール錠8mg	アルツハイマー型認知症治療剤	劇
両採用	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	全身麻酔用鎮痛剤	麻劇
院外採用	レルパックス錠20mg	片頭痛治療剤	劇
両採用	レルベア100エリプタ30吸入用	喘息・COPD治療配合剤	
両採用	レルベア200エリプタ30吸入用	喘息治療配合剤	
院外採用	レルミナ錠40mg	GnRHアンタゴニスト	劇
院外採用	レンドルミンD錠0.25mg	睡眠導入剤	
院外採用	レンドルミン錠0.25mg	睡眠導入剤	
両採用	レンビマカプセル10mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両採用	レンビマカプセル4mg	抗悪性腫瘍剤	劇

両採用	ロイケリン散10%	メルカプトプリン製剤	劇
両採用	ロイコボリン注3mg	抗葉酸代謝拮抗剤	
両採用	ロイスタチン注8mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両採用	ロイナーゼ注10000	抗悪性腫瘍酵素製剤	劇
両採用	ロイナーゼ注5000	抗悪性腫瘍酵素製剤	劇
院外採用	ローコール錠10mg	HMG-C o A還元酵素阻害剤	
院外採用	ローコール錠20mg	HMG-C o A還元酵素阻害剤	
院外採用	ローコール錠30mg	HMG-C o A還元酵素阻害剤	
院外採用	ロートエキス散「ニッコー」	鎮痙剤	劇
両採用	ロープレナ錠100mg	抗悪性腫瘍剤/チロシinkinナーゼ阻害剤	劇
両採用	ロープレナ錠25mg	抗悪性腫瘍剤/チロシinkinナーゼ阻害剤	劇
院外採用	ロカルトロールカプセル0.25	活性型ビタミンD3製剤	劇
院外採用	ロカルトロールカプセル0.5	活性型ビタミンD3製剤	劇
院外採用	ロキソニンゲル1%	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	
院外採用	ロキソニンテープ100mg	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	
院外採用	ロキソニンテープ50mg	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	
院外採用	ロキソニンパップ100mg	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	
院外採用	ロキソニン細粒10%	鎮痛・抗炎症・解熱剤	
院外採用	ロキソニン錠60mg	鎮痛・抗炎症・解熱剤	
両採用	ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	
両採用	ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	鎮痛・抗炎症・解熱剤	
院外採用	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	鎮痛・抗炎症・解熱剤	
両採用	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	非脱分極性麻酔用筋弛緩剤	
院外採用	ロケルマ懸濁用散分包10g	高カリウム血症改善剤	
両採用	ロケルマ懸濁用散分包5g	高カリウム血症改善剤	
院外採用	ロコアテープ	経皮吸収型鎮痛消炎剤	劇
院外採用	ロコイドクリーム0.1%	外用副腎皮質ホルモン剤	
両採用	ロコイド軟膏0.1%	外用副腎皮質ホルモン剤	
院外採用	ロコルナル錠100mg	循環機能改善剤	
両採用	ロサルタンK錠25mg「トーワ」	A-IIアンタゴニスト	
院外採用	ロソーゼット配合錠HD	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-C o A還元酵素阻害剤配合剤	
院外採用	ロソーゼット配合錠LD	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-C o A還元酵素阻害剤配合剤	
両採用	ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」	HMG-C o A還元酵素阻害剤	
院外採用	ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」	HMG-C o A還元酵素阻害剤	
院外採用	ロズリートレカプセル200mg	抗悪性腫瘍剤/チロシinkinナーゼ阻害剤	劇
両採用	ロゼウス静注液40mg	ピンカアルカロイド系抗悪性腫瘍剤	
両採用	ロゼックスゲル0.75%	がん性皮膚潰瘍臭改善・酒さ治療剤	
両採用	ロセフィン静注用0.5g	セフェム系抗生物質	
両採用	ロセフィン静注用1g	セフェム系抗生物質	
院外採用	ロゼレム錠8mg	メラトニン受容体アゴニスト	
両採用	ロドピン錠25mg	統合失調症治療剤	劇
院外採用	ロドピン錠50mg	統合失調症治療剤	劇
院外採用	ロトリガ粒状カプセル2g	EPA・DHA製剤	
両採用	ロナセンテープ20mg	抗精神病剤	劇
両採用	ロナセン錠2mg	抗精神病剤	劇
院外採用	ロナセン錠8mg	抗精神病剤	劇
両採用	ロピオン静注50mg	非ステロイド性鎮痛剤	劇
院外採用	ロピニロールOD錠1mg「アメル」	ドパミンD2受容体系作動薬	劇
両採用	ロピバカイン塩酸塩0.75%注75mg/10mL「テルモ」	長時間作用性局所麻酔剤	劇
両採用	ロフラゼパ酸エチル錠1mg「サワイ」	持続性心身安定剤	精3

院外採用	ロフラゼブ酸エチル錠 1 m g 「トーワ」	持続性心身安定剤	精 3
院外採用	ロベミンカプセル 1 m g	止瀉剤	
両採用	ロベミン小児用細粒 0. 0 5 %	止瀉剤	
両採用	ロベラミド塩酸塩カプセル 1 m g 「N I G」	止瀉剤	
両採用	ロミプレート皮下注 2 5 0 μ g 調製用	血小板造血刺激因子製剤	
両採用	ロラゼパム錠 0. 5 m g 「サワイ」	マイナートランキライザー	精 3
院外採用	ロルカム錠 4 m g	非ステロイド性消炎・鎮痛剤	劇
院外採用	ロングス錠 1 0 m g	A C E 阻害剤	
院外採用	ロングス錠 2 0 m g	A C E 阻害剤	
院外採用	ロングス錠 5 m g	A C E 阻害剤	
両採用	ロンサーフ配合錠 T 1 5	抗悪性腫瘍剤	劇
両採用	ロンサーフ配合錠 T 2 0	抗悪性腫瘍剤	劇
院外採用	ワーファリン錠 0. 5 m g	抗凝固剤	
両採用	ワーファリン錠 1 m g	抗凝固剤	
院外採用	ワーファリン錠 5 m g	抗凝固剤	
院外採用	ワーファリン顆粒 0. 2 %	抗凝固剤	
両採用	ワイスタール配合点滴静注用 1 g バッグ	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質	
両採用	ワイドシリン細粒 2 0 %	ペニシリン系抗生物質	
院外採用	ワイバックス錠 0. 5	マイナートランキライザー	
両採用	ワゴスチグミン散 (0. 5 %)	副交感神経興奮剤	劇
両採用	ワコピタル坐剤 1 0 0	催眠・鎮静・抗けいれん剤	劇 精 3
両採用	ワコピタル坐剤 1 5	催眠・鎮静・抗けいれん剤	劇 精 3
院外採用	ワソラン錠 4 0 m g	C a 拮抗性不整脈・虚血性心疾患治療剤	
両採用	ワソラン静注 5 m g	C a 拮抗性不整脈治療剤	劇
院外採用	ワンアルファ錠 0. 2 5 μ g	活性型ビタミン D 3 製剤	劇
院外採用	ワンアルファ錠 0. 5 μ g	活性型ビタミン D 3 製剤	劇
院外採用	ワントラム錠 1 0 0 m g	持続性がん疼痛・慢性疼痛治療剤	劇
両採用	エフェドリン「ナガサ」注射液 4 0 m g	気管支拡張・鎮咳剤, 昇圧剤	劇
院外採用	亜鉛華 (1 0 %) 単軟膏「ホエイ」	収斂・消炎・保護剤	
両採用	亜鉛華 (1 0 %) 単軟膏シオエ	収斂・消炎・保護剤	
両採用	亜鉛華デンプン	収斂・消炎・保護剤	
院外採用	亜鉛華軟膏「ニッコー」	収斂・消炎・保護剤	
両採用	亜鉛華軟膏「ホエイ」	収斂・消炎・保護剤	
両採用	一硝酸イソソルビド錠 2 0 m g 「トーワ」	狭心症治療剤	
両採用	一般診断用精製ツベルクリン (P P D) 1 人用	生物学的製剤	劇
両採用	液状フェノール「ケンエー」	殺菌消毒剤	劇
両採用	塩化インジウム (1 1 1 l n) 注* (日本メジフィジックス)	造血骨髄診断薬	
両採用	塩化タリウム-T l 2 0 1 注射液	心臓疾患・腫瘍・副甲状腺疾患診断薬	
両採用	塩化ナトリウム「オーツカ」	調剤用薬 (食塩)	
両採用	塩化ナトリウム「オーツカ」	調剤用薬 (食塩)	
両採用	塩化ナトリウム「オーツカ」	調剤用薬 (食塩)	
両採用	塩化ナトリウム注 1 0 % 「フソー」	電解質補給液	
両採用	塩酸メトクロプラミド注射液 1 0 m g 「タカタ」	消化器機能調整剤	
院外採用	葛根湯エキス顆粒 T	漢方製剤	
両採用	乾燥まむしウマ抗毒素注射用 6 0 0 0 単位「K M B」	抗毒素類	劇
院外採用	乾燥酵母エビオス	ビタミン B ・蛋白補給剤	
両採用	含嗽用ハチアズレ顆粒	口腔・咽頭疾患含嗽剤	
院外採用	眼・耳科用リンデロン A 軟膏	合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤	
両採用	希ヨードチンキ「東豊」	殺菌消毒剤	
両採用	強力ネオミノファーゲンシー P 静注 2 0 m L	肝臓疾患・アレルギー用剤	
院外採用	強力ポステリザン (軟膏)	痔疾治療剤	
院外採用	苦味チンキ「ニッコー」	苦味健胃剤	
両採用	経口用トロンピン細粒 1 万単位	上部消化管止血剤	

院外採用	経口用トロンピン細粒 1万単位「サワイ」	上部消化管止血剤	
両採用	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」	血漿分画製剤	特生
両採用	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	血漿分画製剤	特生
両採用	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	血漿分画製剤	特生
両採用	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL	血漿分画製剤	特生
両採用	献血ポリグロビンN10%静注10g/100mL	血漿分画製剤	特生
両採用	光糖液5%	糖類製剤	
院外採用	三和芍薬甘草附子湯エキス細粒	漢方製剤	劇
両採用	酸化マグネシウム「NP」原末	制酸・緩下剤	
院外採用	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	制酸・緩下剤	
院外採用	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	制酸・緩下剤	
院外採用	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	制酸・緩下剤	
両採用	歯科用キシロカインカートリッジ	局所麻酔剤	劇
両採用	歯科用キシロカインカートリッジ	局所麻酔剤	劇
両採用	歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ	局所麻酔剤	劇
両採用	歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ	局所麻酔剤	劇
院内採用	歯科用ホルマリンクレゾール	根管消毒剤	劇
院内採用	歯科用ヨード・グリセリン	有機殺菌消毒剤	劇
両採用	次亜塩6%「ヨシダ」	殺菌消毒剤	
院外採用	重カマ「ヨシダ」	制酸・緩下剤	
院外採用	小児用フルナーゼ点鼻液25μg/56噴霧用	定量噴霧式鼻過敏症治療剤	
院外採用	小児用ムソルバンシロップ0.3%	気道潤滑去たん剤	
両採用	消毒用エタノール液IP	殺菌消毒剤	
院外採用	硝酸イソソルビド徐放錠20mg「トーワ」	虚血性心疾患治療剤	
両採用	硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	冠血管拡張剤	
両採用	硝酸銀「VTRS」原末	眼科用殺菌剤	劇
両採用	新レシカルボン坐剤	便秘治療剤	
両採用	新鮮凍結血漿-LR「日赤」480	血液成分製剤	特生
両採用	親水クリーム「ホエイ」	軟膏基剤	
両採用	親水ワセリン「ホエイ」	軟膏基剤	
両採用	診断用アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」	アレルゲン検査薬	
両採用	酢酸「ケンエー」	皮膚軟化剤	
両採用	水溶性プレドニン10mg	合成副腎皮質ホルモン剤	
両採用	水溶性プレドニン20mg	合成副腎皮質ホルモン剤	
両採用	生食注シリンジ「オーツカ」10mL	生理食塩液	
両採用	生理食塩液「ヒカリ」	生理食塩液	
両採用	生理食塩液PL「フソー」	生理食塩液	
両採用	生理食塩液PL「フソー」	生理食塩液	
両採用	生理食塩液バッグ「フソー」	生理食塩液	
両採用	精製ラノリン	軟膏基剤	
両採用	静注用キシロカイン2%	抗不整脈剤	劇
両採用	組織培養不活化狂犬病ワクチン	ウイルスワクチン類	劇
両採用	大塚蒸留水	注射用水	
両採用	大塚食塩注10%	電解質補給液	
両採用	大塚生食注	生理食塩液	
両採用	大塚生食注	生理食塩液	
両採用	大塚生食注	生理食塩液	

両採用	大塚生食注	生理食塩液	
両採用	大塚生食注 2ポート 100mL	注入針付溶解剤	
両採用	大塚生食注 2ポート 50mL	注入針付溶解剤	
両採用	大塚糖液 10%	糖類製剤	
両採用	大塚糖液 20%	糖類製剤	
両採用	大塚糖液 5%	糖類製剤	
両採用	大塚糖液 5%	糖類製剤	
両採用	大塚糖液 5%	糖類製剤	
両採用	大塚糖液 5%	糖類製剤	
両採用	大塚糖液 5%	糖類製剤	
両採用	大塚糖液 50%	糖類製剤	
両採用	大塚糖液 50%	糖類製剤	
両採用	単シロップ	矯味剤	
両採用	炭酸ランタンOD錠 250mg 「FCI」	高リン血症治療剤	
両採用	炭酸ランタンOD錠 250mg 「JG」	高リン血症治療剤	
院外採用	炭酸ランタンOD錠 250mg 「フソー」	高リン血症治療剤	
両採用	炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	制酸剤	
院外採用	炭酸水素ナトリウム錠 500mg 「VTRS」	制酸剤	
両採用	注射用イホマイド 1g	アルキル化剤	劇
両採用	注射用エラスポール 100	好中球エラスターゼ阻害剤	
両採用	注射用エンドキサン 500mg	アルキル化剤	劇
両採用	注射用サイメリン 100mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両採用	注射用サイメリン 50mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両採用	注射用フィルデシン 3mg	抗悪性腫瘍剤	劇
両採用	注射用ペニシリンGカリウム 100万単位	ペニシリン系抗生物質製剤	
両採用	注射用メソトレキセート 50mg	葉酸代謝拮抗剤	劇
両採用	注射用メソトレキセート 5mg	葉酸代謝拮抗剤	劇
両採用	注射用水	注射用水	
両採用	注射用水「フソー」	注射用水	
両採用	注射用水PL「フソー」	注射用水	
両採用	注射用水バッグ「フソー」	注射用水	
両採用	調剤用パンピタン末	総合ビタミン剤	
院外採用	沈降炭酸カルシウム	制酸剤	
院外採用	沈降炭酸カルシウム錠 250mg 「三和」	高リン血症治療剤	
両採用	沈降炭酸カルシウム錠 500mg 「三和」	高リン血症治療剤	
両採用	沈降破傷風トキシイド「生研」	トキシイド類	劇
両採用	低分子デキストランL注	血漿増量・体外循環灌流液	
両採用	点眼・点鼻用リンデロンA液	合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤	
両採用	点滴静注用ホスカビル注 24mg/mL	抗ウイルス化学療法剤	
両採用	乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	カルシウム剤	
両採用	乳酸ピペリデン注 5mg 「ヨシトミ」	パーキンソン症候群治療剤	劇
両採用	乳糖水和物「ケンエー」	賦形剤	
両採用	白色ワセリン* (VTRS)	軟膏基剤	
両採用	無水エタノール「ケンエー」	殺菌消毒剤	
両採用	無水エタノール注「フソー」	経皮的エタノール注入療法用剤	
院外採用	滅菌精製水 (容器入り)	溶解剤	
両採用	薬用炭「日医工」	止瀉・整腸剤	
院外採用	幼児用PL配合顆粒	総合感冒剤	
両採用	流動パラフィン「ケンエー」	軟膏基剤	
両採用	硫酸Mg補正液 1meq/mL	補正用電解質液	
院外採用	硫酸マグネシウム* (山善)	緩下剤	